

RB45394



Library
of the
University of Toronto



STILLMAN DRAKE

CF 42



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/dioptricesevdemo00kepl>

18

of the

of the



MAN DRAKE

IOANNIS KEPLERI
Sæ. Cæ. M^{ti}s. MATHEMATICI

DIOPTRICE^s

SEV

Demonstratio eorum quæ visui & visibilibus pro-
pter Conspicillan non ita pridem inventa
accidunt.



*Premissa Epistola Galilæi de ijs, quæ post editionem Nunciij siderij
ope Perspicilli, nova & admiranda in cælo
deprehensa sunt.*

Item

*Examen præfationis Ioannis Penæ Galli in Optica Euclidis, de
usu Optices in philosophia.*



58

AVGVSTAE VINDELICORI
typis Davidis Franci.

Cum priuilegio Casareo ad annos XV.

M. DCXI.

Catalogo

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

IOANNIS KEPLER
S. C. M. M. A. T. H. E. M. A. T. I. C. I.

DIOPTRICE

SEV

Demonstratio conuerti quæ signi & visibilibus pro-
per Conspicillium in quibus inuenerit
sociantur.

34

Francis Episcopus Coloniensis & Archiepiscopus Ratisbonensis
conspicillium, sicut & aduersus haec
apud Regium

Item

Eximius Professor in Collegio Publico in Civitate Barchinensi
de Opticis & Dioptricis



Carolo

ALONSO DE BARRA
1600

Cum

1600

Carolo

REVERENDISSIMO ET
SERENISSIMO PRINCIPI A C D.

D. Ernesto Archiepiscopo Coloniensi, S. Romani Imperij
Septemviro Electori & per Italiam Archicancellario Episco-
po Leodiensi, Administratori Monaster: Hildes: & Frisin-
gensi, Principi in Stabel. Comiti Palat. Rheni, sup: &
infe: Bavarix VVestphalix Ang. &c. Duci, March

Franci mont Domino meo clemen-
tissimo.

Reverendissime & Serenissime Princeps
Electoꝝ, Domine clementissime: Cum
superioribus annis ad magnum cumu-
lum inventionum huius ultimi seculi ac-
cessisset Arundo dioptrica, nequaquam inter vulgares
connumeranda machinationes; circaq; eam alij de
palma primæ inventionis certarent, alij de perfectio-
ne instrumenti sese jactarent amplius, quod ibi casus
potissimum insit, hic Ratio dominetur; Galilæus vero
super usu patefacto in perquirendis arcanis Astrono-
micis speciosissimum triumphum ageret; ut cui con-
siliū suppeditauerat industria, nec successum nega-
verat fortuna: Ego ductus honesta quadam æmulati-
one novum Mathematicis campum aperui exerendi
vim ingenij, hoc est causarum lege geometrica de-
monstrandarum, quibus tam exoptati, tam jucundâ
varietate multiplices effectus inniterentur. Cum

) (2 enim

enim ante sex annos Opticam Astronomiæ partem e-
didissem, in qua & de visionis modo nova ratione, &
de perspicillis primus omnium, quod sciam, talia di-
sputaveram, quæ ad hunc usq; diem stant inconcussa:
consentaneum erat, ut ostenderem eadem fundamen-
ta, quibus visionis modum, quibusq; perspicillorum
simplicium effectus superstruxeram, etiam compositi-
oni diversarum lentium perspicuarum in unam arun-
dinem, ferendæ sufficere: adeoq; ne quidem posse fieri
(quod veritatis argumentum est) ut alijs quibuscun-
que principijs, quam quibus ego sum usus, demonstra-
tio hæc expediatur. Ac cum Euclides Optices speci-
em fecerit Catoptricen; quæ de radio repercusso agit;
nomine deducto à præcipuo huius generis machina-
mento, Speculis; eorumq; mira & jucunda varietate:
ad exemplum hoc meo libello natum est nomen Dio-
ptrice; quia agit potissimum de radio refracto à medi-
is pellucidis densis, tam naturalibus in oculo humano,
quam artificialibus in perspicillorum varietate; quo
subjecto contra Catoptricen, ut species contra speci-
em, distinguitur: sic tamen ut prior sit Dioptrice, po-
sterior Catoptrice; propterea quod Catoptrice circa
imagines versetur, quæ, quid omnino sint, citra cogni-
tionem oculi ex Dioptrice petendam, intelligi ne-
quit.

Qua etiam de causa repetij modum visionis & sim-
plicium

plicium perspicillorum rationes; cùm ut Dioptrice quodammodo perfecta esset, tum quia Instrumenti rationes ab hominis oculo nexæ sunt, ipsumq; instrumentum è simplicibus perspicillis compositum: ut alterum sine altero expediri non possit. Denique quia censuerunt aliqui, in Opticis hæc à me pertractata esse obscurius; ut multis non ingenij hebetudo, sed doctoris culpa impedimento sit, quo minus scripta & demonstrata percipiant. Eis igitur ut consulerem, quædam hic tradidi brevius, alia prolixius, nonnulla alijs verbis concepi; definitiones terminorum, quos usurpo geometrica libertate, continuo numero inter propositiones, oportunis locis recensui; schemata (quæ sunt Geometrarum genuinæ literæ) plura addidi. Quâ operâ si non omnem obscuritatem sustuli, spero Philosophiæ studiosos imbecillitati meæ aliquid condonatueros, operamq; hanc boni consulturos.

Porro in hanc curam eo potissimum tempore incubui, quo ingenium meum lamentabili quodam frigore torpens, Sol munificentissimus præsentis R^{mæ}. & S^{cæ}. C^{is}. tuæ concalefecit, clementissimaq; Eius alloquia & hortatus crebri, veluti Mercurius aliquis, è somno excitarunt. Ejus deniq; Mathematici & Cubicularij Nobilis D. Ioannis Zuckmesseri, jucundissima simul & ingeniosissima machinamenta manuarum, vitæq; expolitiones artificiosissimæ, quibus R. S. C.

Tuam mirificè delectari videbam, ad ejusdem veluti officij æmulationem provocarunt. Quod si me non impellerent hæ singulares causæ ad Dioptricen hanc meam R. & S. C. Tuæ dedicandam : tunc vel sola illa in genere sufficeret, quod Mathematici libelli ut remoti à vulgi captu, eoq; contempti, nemini rectius offeruntur, quam qui de illis judicare possunt; quos acri ingenio à Natura instructos, amor philosophiæ & meditatio ad perfectam harum rerum cognitionem provexit. Qua in cognitione num quem inter Principes Viros hoc tempore parem habeas, incompertum mihi est: inter professores certè Academiarum, qui huic judicio pares sint, pauciores reperiuntur, quam ex usu sit.

Quod si nulla in creberrimis librorum dedicationibus fucatiore essent Patronorum encomia, quam sunt ista; credo fidem, quam circa Patronorum virtutes fere decoxerunt dedicationes; brevi restaurarent. Atque ego in hunc ipsum finem supersedeo reliquas (ut fieri solet in dedicationibus) R. & S. C. Tuæ commemorare virtutes; ne sutor ultra crepidam sapere velle videar.

De cætero non aliam lectori suspendo hederam, quam ut ei indicem, libellum à tali principe comprobatum, lucemque videre jussum. Et jam R. & S. C. Tæ me subiectissimè commendo. Vale: Cal. Januarijs
anni

anni undecimi de seculo septimo decimo : quem R.
& S. C. T^a. felicissimum in gubernatione, in sapien-
tia studio, inque corporis tuendâ sanitate compre-
cor.

Reverendissimæ & Sere-
nissimæ C. T^a.

Devotissimus

S C Matis Mathema-
ticus

Ioannes Keplerus.



1

IOANNIS KEPLERI IN DIOPTRICEN PRÆFATIO, DE USU ET PRÆ- stantia perspicilli nuper inventi: deq; novis cœlestibus per id detectis.

Libellum exhibeo, lector amice, mathematicum, hoc est captu non
adeò facilem: & qui non tantum ingenium in lectore requirat,
sed etiam attentionem mentis præcipuam, & cupiditatem incredibili-
lem cognoscendi rerum causas.

Hoc dum perpendo, visum est aliqua commentari de præstantia Di-
optrarum seu Perspicillorum, deq; admirabili eorum effectu in profe-
rendis philosophiæ terminis: ut ingeniosi adolescentes, cateriq; Ma-
theseos cultores hoc utilitatis veluti stimulo incitati ad rationes in-
strumenti ex hoc libello percipiendas incitentur.

Multa sunt & magna, quæ de usu Optices universæ præfatus est Io-
annes Pena Gallus, Regius quondam Mathematicus, in editione Opti-
corum & Catoptricorum Euclidis, à se versorum: quantacunq; tamen
ea sint, præ illis quæ hoc biennio dioptrarum beneficio sunt patefacta,
planè puerilia possunt haberi.

Et quia lectori præfationem illam hac mentione commendo, age
præcipua ejus capita strictim examinemus; ne cum veris & præclaris,
quæ in ea sunt, etiam dubia & falsa quæ interspersa esse, negare non
possum, sciens prudensq; obstruisse videar. Vbi hoc absolvero; tum de-
mum quæ nova Perspicillaria disciplina hoc tempore detexerit, sub-
jungam.

Primum de Cælo dogma, cum Penâ statuo ex Optica solidè demon-
strari: falli nimirum vehementer phisicos, adeoq; & rheologos non-
nullos; qui putant, novem vel decem esse pellucas sphaeras hunc
mundum Elementarem amplexas, ut Album Ovi solet amplecti vi-
tellum, aut tunica caparum alia aliam circumcludunt. Cum enim ne-
cessaria ratione statuatur itinera planetarum Eccentrica, rectè colli-

git Opticus, radios à stellis per hæc tam spaciofa volumina obliquè descendentes (quippe in terram extra quorundam orbium centra constitutam) lege optica refractum iri: quo concesso tollitur omnis observationum certitudo, cui tamè testimoniū perhibet experientia. Sequitur hoc idem etiam ex proportione corporis telluris ad orbem luna satis perceptibili. Et si enim dissimulemus orbis Eccentricos, terramq; in centro omnium orbium collocemus: eo ipso tamen superficies terra satis longo intervallo à centro Sphærae luna, quod ipsa suo centro occupat, obsistit: rursumq; ad superficiem Terra quam nos inhabitamus descendunt radij stellarum, obliquè secantes orbem luna, contingetq; ut ij refracti turbent certitudinem aspectus.

Nondum eg ressus Pena ex hujus pulcherrima demonstrationis vestibulo, improvidè nimium impingit, discrimen tollens non tantum orbium inter se, sed etiam aëris & ætheris: dumq; materiam ætheris eandem facit cum materia hujus quem spiramus aëris, docet ipso etiam lapsu suo, quanti intersit ambulantis in Philosophia palatio, Optices oculos benè apertos habere. Eodem enim argumento, quo discrimen tollitur orbium inter sese, vicissim discrimen stabilitur aëris hujus, & qui ei paulo supra montium culmina succedit, ætheris.

Et si enim observationes astronomica non turbantur multiplici aliqua ratione refractionum inter sese variè implexarum, qualem orbium discrimina & soliditas requirerent, si essent; turbantur tamen uniformi quadam ratione refractionum, quando sidera horizonti appropinquant: quæ refractiones aliunde esse nequeunt, quàm ex superficie aëris hujus quem spiramus: adeo quidem, ut in Astronomia parte optica hinc etiam altitudinem illius superficie à superficie Terra potuerim investigare. Provocat Pena ad experientiam, induceto teste oculato, Gemma Frisio cum baculo suo astronomico, qui negavit à se ullas refractiones esse deprehensas. Nimirum Penæ tunc nondum erat cognita admirabilis industria summi Artificis Tychoonis Brahe; qui partim operarum multitudine, partim instrumentorum magnitudine & subtilitate.

3

tate modicum illud assecutus est, quod crassum Gemma instrumentum, hominisq; unius & solitarij attentionem effugerat. Et adduxi ego in Astronomiæ parte optica pro refractionibus testes Braheo succenturiatos ex antiquitate, eòq; integros & incorruptos.

Audio D: D: Helisæum Röslinum problema mihi proposuisse solvendum de sole 14. dierum spacio citius justò à Batavis in septentrionali Terra viso. Librum ejus non vidi per hos tumultus. Admoneo tamen, questionē hanc à me per Refractiones aëris expeditam in Astron. parte Optica cap. IV. Num. 9. fol. 138.

Secundas Pena partes dedit dogmati de itineribus planetarum verè Eccentricis; & rectè dedit. Habet Optice firmissima pro his argumenta. Illud solum cavendum; ne nobis accidat, quod veteribus, ut alteri Optices oculo nimium securè confidentes in pervidendâ hac planetarum orbitâ; alterum Physices oculum claudamus; & sic quod utriusq; & Optices & Physices rationibus ex aequo tribuendum erat, soli opticae tribuentes, rursus à scopo aberremus. Qua de re vide meam Astronomiæ partem Opticam, & commentaria de Martis motibus.

Tertio loco examinat Pena ex Optica questionem de ordine planetarum: nec malè ratiocinatur ex Aristotele, siquidem Terra suo stet fixa loco, non esse verisimile, ut Sol, Venus, & Mercurius, tribus distinctis orbibus in aequali magnitudine, aequali tamen periodo circumeant: quin potius consentaneum, quod Martiano Capella, Campano, & Braheo placuit, in frag; Galilaus evidentissimè probat, siquidem Sol vehitur, uno illos orbe vehi, Solem q; ut axem Rotarum ab Epicyclis Veneris & Mercurij veluti à Rotarum Apsidibus ambiri: imò verò probabilissimum esse, quod Copernicus, quod ante tot secula illa antiquissima philosophia Samia tenuit, Solem in medio stare fixum loco; circaq; eum non Mercurium & tantum Venerem, suo quemq; tempore sed, ipsam adeo Tellurem cum Lunâ, sua comite, circumire motu annuo, cæterosq; tres suis itidem periodis.

Rursum autem Pena hic sese cum aliquo veritatis damno ex sentibus

perplexarum ratiocinationum expedit. Etenim argumentum hoc, nulla adeò evidenti necessitate revinctum de probabilitate sola testabatur. Pena igitur diffusus argumento dubio mobilitatem terra, qualem Copernicus docet, timide dimittit è manibus, ipse contra levi niçtu Oculi Optici, fiduciam concepit aliis cujusdam tardissimi motus terra pervestigati: quo posito sequi putat, ut fixa motum videantur sortiri inequalem: qualem fixarum esse motum, seculorum dispar consensus testetur. Atqui ô Pena, hoc non est commendare præstantiam Optices, sollicitare ejus vires in rebus impossibilibus. Generosus omninò fuit Bucephalus, etsi Pegasi alas imitari non potuit. Et si quis Bucephalum testatus volantem conspectum arguatur falsi, non ideo Bucephali gloria conciderit. Nimum ô Pena, recessit hæc tua ratiocinatio à principijs opticis, nimum multa inter tuum assumptum Opticum, interq; id quod inde concludis, intercedunt. Primum non tetigit te sollicitudo illa super veritate Observationum, quas ex illa profunda antiquitate ablegamus hodie. Deinde motum fixarum allegas, ut rem oculis visam. Atqui nimio multum abest ab oculorum conspectu: subtilissimarum ratiocinationum trium in unum compositione nec eâ strictissimâ, vix tandem pronunciare audent Astronomus, quo Zodiaci loco quovis seculo fixa aliqua consistat. Deniq; quem tu dicis motum fixa à puncto æquinoctij; is contra verissimè est retrocessus puncti æquinoctialis à fixâ stellâ: ubi punctum æquinoctiale longissimè aberrat à Penæ conceptione. Quid enim aliud est punctum æquinoctiale, quam imaginaria intersectio duorum imaginariorum circularum, quorum alter intelligitur à sole per orbitam Telluris usq; in supremum ætherem continuari, alter itidem intelligitur à centro Terra per æquinoctialem terrestrem usq; sub fixas continuari, idq; non in omni situ terra, sed tunc tantum, quando Terra est in punctis æquinoctialibus. Sed de hac re in astronomia docetur, inq; meis de Marte Commentarijs. Frustra igitur ex tam incertis Penæ male informatus, Terra motum aliquem novum tribuit, eumq; tardissimum; quo motu illa à centro mundi exulet.

let: præstitisset cum Telluris retinere motum, quem præstantissimi artifices introduxere: qui motus certò Terram circumducit extra centrum mundi planetarij tanto intervallo, quanta putatur esse semidiameter sphaerae Solis.

Non possum autem præterire, quin etiam hunc Pena lapsum ex ipsius præfatione eliminem, ubi Copernici censuram super Ptolemaicâ lunæ Hypothesi falsitatis arguit. Hac enim in simulatione plurimum nocetur existimationi tanti artificis apud imperitos. Refellit Ptolemaum Copernicus, cujus supposita Lunam bisectam penè duplo propiorè Terris exhibent, quàm cum plena est. Argumentum falsitatis Copernicus sumpsit Opticum, idq; optimum; oportuisse ut & corpore duplo ferè latior appareret bisecta quàm plena: cum experientia testetur de constanti nec nisi pauculus minutis variabili diametro. Hic Pena subtilitate abusus axiomatis optici à Copernico adducti, quod in his propositionibus repetitur Numero 67. argumentum impertinenter elevat. Quid tum enim, si maximè apparentes diametri luna non præcisè sunt in eversa proportione distantiarum; si tamen sunt ferè in eâ, num idè idè nihil dixit Copernicus? Negat dux exercitus se urbem in qua sunt decem millia prædiariorum militum, expugnare posse nisi cum quinquaginta millibus. Quid igitur si desit illi unus aliquis de hoc numero, num ideo tergiversabitur super expugnatione?

Sed ad numerum revertor dogmatum quæ Pena ex optica verissimè probat; quorum hoc est quartum: quod rectissimè ex optica arguitur nullam supra nos esse sphaeram ignis: quo fundamento subruto, quanta sequatur ruina Meteorologiae Aristotelicæ, nemini Philosophorum hujus Temporis obscurū esse potest. Si enim sub cælo esset ignis; seu cõspicuis ille seu inconspicuis, omnino magna fieret refractione radiorū. Nam ignis idè superiora petit, quia tenuioris est substantiæ; quàm aër. Ut enim inflata vesica ex aqua profundo emergit, pondere aqua sursum elisa: sic etiam ignea substantia causam ascensus sui ex tenuitate sua consequitur, pellitur enim à circumflui aëris crassiore corpore.

Cum igitur physici dicant, supra capita nostra circumfusam esse substantiam pellucidam, tenuiorem aëre hoc nostro; negare non poterunt, radios visibilium in transitu confinium crassi aëris & ignis tenuioris superficierum, quacumq; obliquè transeunt, refringi: transeunt autem obliquè ad locum spectantis prater unum omnes. Vndiq; igitur magna fierent refractiones radiorum.

Argumenti vis experimento, veluti ad oculum explicari potest. Luceat Sol contra parietem: Interlocetur thuribulum cum carbonibus vivis: si tranquillus sit aër, ex thuribulo rectè ascendet rivus quidam ignea substantia, nullo fumo immixto; sin ventulus interflet, rivus ille parum ad latus deflectet, vento concedens sursum, tamen undulatione sua scaturiens. Rivum hunc ignis oculis non consequeris, quippe colore omni carentem & pellucidum. At si parietem oppositum aspicias, tremere videbis umbras rerum trans prunam in sole positarum, quæ umbræ per hunc ignis fluxum traïciuntur. Tremor verò motus species est. Itaq; radij solis, umbram circumscribentes tremunt, propterea quod ebullitionem illam igneam transeuntes franguntur, idq; variè pro varia superficierum illius fluxus ignei transformatione: ex qua inconstanti inflexione radiorum in superficie illius ebullitionis, resultat inconstans etiam inflexorum seu refractorum incidentia in parietem, inconstansq; hoc est tremens, umbra projectio. Hoc igitur experimento constat, radios lucis in superficie ignea substantia, quantumvis inconspicua sit, sensibiliter refringi. Nulla igitur talis ignea substantia sub cælo expansa est, nostris imminens capitibus, neq; fluctuans, neq; tranquilla, quia observatores siderum nullam, neq; tremulam deprehendunt stellarum refractionem lociq; permutationem, neq; constantem, quæ sit commensurata figuræ spheræ ignea; deniq; nullam aliam prater eam quæ est superficier aëris.

Hoc firmissimum argumentum, Pena rursus tractat incautè:
dumq;

7

dumq; muros quatit sphaera ignea, nimio arietis hujus impulsu à se ipse leditur. Putat ad firmitatem argumenti pertinere, si planè nullas siderum refractiones admittat. Itaq; non dubitat etiam observationibus Astronomorum fidem derogare, quas Vitellio adducit. Dixerat Vitellio, refringi radios lucis; idq; in Luna sentiri, cujus saepe alia videatur latitudo, quàm qualem Tabula motuum admittant. Pena occurrit, non esse in causa refractionem, sed Parallaxin, rem notam Astronomis. Mira me hercule negotij perplexitas. Nam & uterq; verum dogma habet, & uterq; id impertinenter probat, interq; probandum in errores incidit circa res cognatas. Verè dicit Vitellio contingere incurvationes radiorum sideralium ob densitatem aëris. Verè & hoc dicit, sed fortuitò, id in Luna deprehendi. Sed quod praesupponit, loca lunæ irrefracta ex calculo illius sui temporis certissimè depromi, eaq; regulam statuit aestimandarū observationum, & deprehendendarum per eas refractionum; vehementer quidem deceptus fuit. Itaq; non facile dixerim, ante Tychonem Brahe à quoquam deprehensas esse refractiones Lunæ; non tantum ob incertitudinem antiqui calculi, sed etiam ob negligentiam Observatorum priorum. Deprehendit autem Braheus refractiones, non tantum per lunam, quod difficilius fit, propter varium & celerem ejus motum; sed multò maximè per fixas. Et tamen vel per solam Lunam, etiamsi non sit certissimus ejus calculus, deprehendi facile possent. Hæc de Vitellionis hallucinatione. Excutiamus jam & Penæ censuram. Verè & is defendit, propter ignis sphaeram nullas contingere refractiones: falsum tamen addit, planè nullas contingere, ne quidem aëris causa. Ineptè deniq; occurrit Argumento Vitellionis etsi, ut dictum, inutili & ruinoso: tribuens Parallaxibus ea quæ Vitellio Refractionibus. Atqui norunt Astronomi, duarum harum rerum effectus esse contrarios. Refractio Lunam attollit, parallaxis deprimit. Hoc non perpendit Pena. Sed ut dixi, nullum est detrimentum, etsi Pena Vitellionis refraction-

refractiones non effugit: sunt enim aëris non ignis effectus. Aëris igitur densiorem superficiem, ut supra dictum, stabiliunt; ignis vero tenuiorem regionem, quod vult Pena, penitus convellunt & eliminant. Vtrinq; igitur præstantia Opticarum demonstrationum elucet, tam in stabilienda distinctione aëris ab aethere, quàm in tollenda fictitia sphaera ignis.

Quinto loco Pena indicat, quanta Physicos ignorantia teneat circa materiam locum & effectus Cometarum; nisi Opticas scholas fuerint ingressi: & quid hac disciplina circa talia natura portenta doceat eos qui se non aspernantur.

Rursum itaq; verum hoc lectori commendo, Cometarum seu Crinitorum barbatorum caudatorum siderum corpora planè pellucida ex Optica doceri, argumento hoc quod caudas à Sole tenent a versas.

Verum secundo & hoc est, corpora illa pellucida densiora esse aethere, in quo discurrunt. Verum est & illud tertium, ex analogia motus cometarum plurima nos de loco Cometarum doceri, certumq; habere plerosq; supra lunam in altissimo aethere versari. At quartum quod addit Pena, dubium est, an Cometis vis calefaciendi insit lege Optica, dum refracti solis radij in corporis cometici ingressu exituq;, post corpus ad coni mucronem coguntur, eaq; coactione vim incendendi concipiunt. Nam ut idem radios sic in conum coire, nusquam sequetur inflammationis violentia nisi in illo ipso coni mucrone, in profundo aethere. Quid verò hoc ad aestum illum qui hic in Terris excitatur? Deinde non cauda illa Cometarum conspicua, conus ipse est radiorum, usus corpore cometae pro basi; sed si plurimum huic speculationi tribuerimus, cauda haec novus conus est, incipiens ibi, ubi conus alter, cujus in corpore cometae basis, in mucronem desinit: quod lex optica docet proximè post corpus cometae fieri. Radij igitur solis, quatenus constituunt conspicuum illum tractum, quem nos caudam appellamus jam iterum divergunt. Incensio vero non ex diversione, sed ex sectione radiorum oritur. Nulla igitur in cauda vis incendendi, sed si est aliqua, est in sectione radio-

radiorum proximè corpus, unde cauda talis incipit.

Et si verò dubia est, ut dixi, hac Pena ratiocinatio de effectu cometae; tantum tamen abest, ut penitus contemnendam judicem; ut potius generosissimam omnibus commendem, & talem, ex qua de cometarum caudis abstrusissimum Natura arcanum erui posse existimem. Scripsi hac de re aliquid in descriptione Germanica Cometae qui fulsit anno 1607: quam latinè etiam adornaveram cum demonstratione pulcherrima trajectus cometae rectilinei per aetheris profundum: sed expectationem meam typographus elusit, manetq; libellus in scrinijs, aliam expectans occasionem.

Sextam Optices utilitatem Pena commemorat, in convellenda Opione Aristotelicorum de Galaxia: docetq; ex Optica, Galaxiam in ipso aethere, longissimè supra lunam circumfundi: quippe quæ permutationem loci sub fixis nullam per diversa terrarum loca, diversosq; ad horizontem positus oculis subjiciat. Magnum procul dubio & hoc optices beneficium agnoscent, qui hætenus Aristotelis Meteorologiam suspexerunt, inq; precio habuerunt. Et si ea, quæ circa Galaxiam Galileus ope perspicilli detexit, ratiocinationem hanc Penæ porrò reddent supervacuum.

Sequuntur in Penæ præfatione deformia nonnulla, quibus rogo ne Optices studiosus moveatur. Visum fieri radiorum receptione Vitellio verissimè statuit; comprobavi ego evidentissimis experimentis. Magna erat Opticorum gloriatio contra Aristotelicos emissionem radiorum defendentes propter consensum ipsorum inter se. Dolendum itaq; Penæ contrario testimonio gloriam hanc Opticorum sædari, præsertim cum & ipse Pena sit Opticus, & ea ipsa in præfatione Opticam commendet. At qui perpendat philosophiæ cultor, rerum abstrusarum investigationem non unius esse sæculi; sæpe veritas furtim quasi in conspectum veniens, negligentia philosophorum offensa subito se rursus subducit, non dignata homines sui conspectu mero, nisi officiosos & industrios. Adde quod Pena Euclidi, quem à se denuò versum illo libello

b exhibuit,

exhibuit, emissiones radiorum usurpanti propter opinionem antiquitatis aliquid tribuit, impertinenti in philosophia studio. Itaq; assumo ex ore Penæ, eiq; rescribo sententiam suam: Physicum volo minimè credulum, ob idq; opticarum demonstrationum experientem, qui Euclidem (ipse Vitellionem dixerat) cæterosque Opticos accuratè examinet, & ijs tantum credat, quantum ab ijs demonstratum videat. Vir fuit Euclides doctrina & eruditione nulli secundus, ut ejus monumenta monstrant, sed quæ communis disciplinarum orientium fors est, opiniones habuit anticipatas, quas pro axiomatibus demonstrationum obtulit, cujusmodi illud est, Aspectum fieri per radios prope- rantes ab oculis ad rem visam, quod tamen non magis necessarium est, quam si visionem receptione radiorum fieri dicas. *Hac inquam hoc loco Penæ regerenda puto. Nam ad demonstrationes quasdam nihil interest, utrum verum sit: & vides utrumq; à me promiscuè usurpari, Propos. 3. & 19. Et si notandum hoc discrimen: si de rei lucentis natura agimus, expedit nos clarè loqui, nec aliud quam emissiones radiorum ex punctis lucentibus inculcare. At si de visione rerum lucentium, deq; visus deceptionibus loquimur, sæpe nos ipse deceptiones invitant ad captiosè quasi loquendum, & emissiones radiorum ex oculo usurpandas, cum reverà sint receptiones radiorum in oculum.*

Cur duobus oculis videntur res una, Penæ rectè refellit falsam Vitellionis rationem, Galeni aequè falsam laudat non rectè. Galenus optici terminis usus est minime ad leges opticas: quasi pyramides visionis, formatæ ipso videndi actu, & à visare, veluti à communi basi ad oculos continuatæ, reale quippiam fierent & corporeum, quæ cum detorsione oculi detorqueri à sua re visa possent. Veram itaq; causam reperies infra Prop. 62.

Explicationem Halonis Iridis Pareliorum, Paraselenarumq; ex Optica disciplina petendam; jam olim vidit Aristoteles: neq; ea quæ
adbus.

adhuc desiderantur in Meteorologicis Aristotelis, aliunde suppleri possunt.

Cogitaveram & Ego hic libellum de Iride subjungere; quod supplementum esset Aristotelicæ super Iride disquisitionis, sed desiderabantur adhuc Parelionum genuina causa, quæ sunt causis portentosarum Iridum implexa: itaq; in præsens hoc negocium deserui.

Cum tam multa profit Optica scientia philosophiæ naturali: jure optimo Pena plura & ab optica expectat, in Magia & Theologia Porphyriana, inq; manuarijs præstigijs discutiendis: nec pauca promittit Io. Baptiste Porta Magia naturalis, quam lector adeat; videbit Opticam disciplinam totâ vitâ humanâ admirabiles explicare utilitates.

Hactenus igitur Pena nobis auditus esto, de præstantia Optices, deq; stupendis ejus effectibus in rerum naturâ detegenda doctissimè perorans.

Nunc tempus, ut promissis fidem præstem; doceamq; hac Optices parte, quam Dioptricen appellamus, ejusq; subjecto, Perspicillis nos de rerum Natura longè admirabilissima brevi temporis spacio didicisse; adeò quidem, ut puerilia videri possint, quacung; hactenus Optices beneficio detecta ex Pena produximus.

Versatur in manibus omnium, siderius Galilei nuncius, & mea qualiscung; cum hoc nuncio Dissertatio, tum etiam Narratiuncula, Nuncij siderij confirmatoria. Lector itaq; breviter perpendat, capita illius Nuncij, quæ & quanta Perspicilli illius beneficio, cujus rationes hoc libello demonstro, fuerint detecta. Testabatur visus, esse aliquod in cælo corpus lucidum, quod Lunam dicimus, demonstratum fuit ex rationibus opticis, id corpus esse rotundum, Astronomia etiam rationationibus nonnullis super optica fundamenta collocatis extruxerat ejus altitudinem à Terra sexaginta circiter semidiametrorum Terra. Apparebant in illo corpore variae maculæ; & secuta est obscura opinio paucorum philosophorum, illata ab Hecateo in fabulas de Hyperboreorum insula, montium & vallium, humoris &

continentium alternata conspici simulachra. At nunc Perspicillum omnia hæc adedò ob oculos collocat, ut planè timidum esse oporteat, qui tali fruens aspectu, etiamnum dubitandum existimet. Nihil est certius, quam partes lunæ meridionales plurimis ijsq; immensis scatere montibus, partes verò septentrionales, depressiores quippe, lacubus amplissimis defluentem à meridie humorem excipere. Quæ prius Pena produxerat Optices beneficio patefacta dogmata, illa à tenuibus visus adminiculis originem trahentia per longas ratiocinationes inter se nexas demonstrabantur, sic ut Rationi potius humanæ, quam Oculis transcriberentur: at hic jam Oculi ipsi nova veluti janua cæli patefacta in conspectum rerum abstrusarum adducuntur. Quod si cui jam super novis hisce observationibus lubeat etiam Rationis vim excutere: quis non videt, quam longè contemplatio Naturæ suæ pomœria prolatura sit; dum querimus, Cui bono in Luna sicut montium valliumq; tractus, marium amplissima spacia; & an non ignobilior aliqua Creatura, quàm homo, statui possit, quæ tractus illos inhabitet.

Nec minus deceditur hinc; & illa quæstio, quæ penè cum ipsa philosophia nata, exercetur hodie à nobilissimis ingenijs, Possit ne Terra moveri, (quod Theorica doctrina Planetarum valde desiderat) sine gravium ruinâ; aut sine turbatione motus elementorum. Nam si Terra à centro mundi exulet, metuunt nonnulli ne aquæ, globo Terræ deserto, in mundi centrum resfluant. Atqui videmus & in Luna inesse vim humoris, depressas ejus globi lacunas obsidentem: qui globus quamvis in ipso æthere circumducatur, extra centra non mundi tantum, sed & Terræ nostræ, non tamen quicquam impeditur copia aquarum Lunarium, quo minus ad centrum sui corporis tendens, Lunæ globo constans adhereat. Itaq; Optica reformat vel hoc Lunaris globi exemplo doctrinam gravium & levium; confirmatq; hic introductionem meam in commentaria Martis motuum.

Habent Samiæ philosophiæ cultores (liceat enim hoc cognomine uti ad indicandos ejus inventores Pythagoram & Aristarchum Samios) etiam

etiam contra apparentem oculis immobilitatem Terra paratum in Luna presidium. Docemur quippe in opticis, si quis nostrum in Luna esset; ei omninò Lunam, domicilium suum, penitus immobilem, Terram verò nostram, Solemque & cætera omnia mobilia visum iri: sic enim sunt comparatæ visus rationes.

Commemoravit antea Pena, quomodo Astronomi Opticis usi principijs magno ratiocinationum molimine viam Lacteam ex elementari mundo, quorsum eam collocarat Aristoteles, in supremum aethera sustulerint. At nunc Perspicilli recens inventi beneficio ipsi astronomorum Oculi rectâ adducuntur ad pervidendam viam lacteæ substantiam: ut quicumque hoc spectaculo fruitur, is fateri cogatur, nihil esse aliud viam lacteam, nisi congeriem minutissimarum stellarum.

Quid esset Nebulosa stella, penitus ignoratum hætenus: perspicillum vero in talem aliquam nebulosam convolutionem (ut Ptolemaeus appellat) directum, ostendit rursum ut in via lactea duas tres vel quatuor clarissimas stellas in arctissimo spacio collocatas.

Quis verò credidisset, Fixarum numerum esse decuplo aut fortè vigecuplo majorem eo, qui est in Ptolemaica fixarum descriptione, si absque hoc instrumento fuisset? Et unde quaeso argumentum petamus de fine seu termino hujus mundi aspectabilis, quod is sit ipsa sphaera fixarum: nisi ab hac ipsa fixarum multitudine perspicillo detectâ: quæ est veluti quedam concameratio mundi mobilis.

Quantum etiam astronomus erret in determinanda Fixarum magnitudine, nisi Perspicilli usu stellas de novo lustret: videre est itidem ap. Galileum; & infra etiam Germani cujusdam literas in testimonium producemus.

Sed omnem admirationem superat illud caput nuncij siderij, ubi Perspicilli perfectissimi beneficio alter nobis velut mundus Iovialis detectus narratur: & mens Philosophi non sine stupore considerat, esse ingentem aliquem globum, qui mole corporis quatuordecim globos terrestres adæquat (nisi hic Galilæi perspicillum nobis limatius aliquid

Brabeanis commensurationibus brevi proferet) circa quem quatuor Luna nostra huic lune non absimiles, circumcurrant; tardissima spacio dierum quatuordecim, nostratum ut Galileus prodidit; proxima ab illa sed maximè omnium conspicua spacio dierum octo, ut Ego superiori Aprili & Majo deprehendi, reliquæ duæ multo adhuc breviori temporis curriculo: ubi Ratio ex meis de Marte commentarijs ad causam similem accersita, suadet statuere, etiam ipsum Iovis globum convolvi rapidissimè, & proculdubio celerius quam in unius diei nostratis spacio: ut hanc globi maximi convolutionem circa suum axem, quatuor illarum Lunarum perennes circuitus in plagam eandem consequantur. Atq; illis quidem locis Sol hic noster, communis & hujus terrestris, & illius Iovialis mundi focus, quem nos tricenùm plurimum minutorum esse censemus, vix sena aut septena minuta implet; interimq; duodecim nostratum annorum spacio Zodiacum emensus apud easdem rursus fixas deprehenditur. Itaq; quæ in illo Iovis globo degunt creatura, dum illa quatuor lunarum brevissima per fixas curricula contemplantur, dum quotidie orientes occidentesq; & ipsas & Solem aspiciunt, Iovem lapidem jurarent (nuper enim ex illis regionibus reversus adsum) suum illum Iovis globum quiescere uno loco immobilem, Fixas verò & solem quæ corpora reverà quiescunt, non minus quam illas suas quatuor Lunas multiplici motuum varietate circa suum illud domicilium converti. Ex quo exemplo multò jam magis, quàm prius exemplo Luna, discet Samia philosophia cultor, quid absurditatem dogmatis de motu Telluris obijcienti visusq; nostri testimonium alleganti, responderi possit. O multiscium, & quovis sceptro preciosius Perspicillum: an, qui te dextrâ tenet, ille non Rex, non Dominus constituatur operum Dei? Vere tu.

Quod supra caput est, magnos cum motibus, orbes, subjicis ingenio.

Si quis paulò æquior Copernico & Samia philosophia luminibus, hic

hic solum haeret, dubitans, quò fieri possit, ut Terrâ medium planetarum iter per campos aetherios terente, Luna illi tam constanter, velut individuus comes adhaereat, interimq; & globum ipsum Telluris circumvolitet, in morem fide caniculae qua viatorem dominum varijs ambagibus nunc antecursitando, nunc ad latera evagando cingit: is Iovem aspiciat, qui, monstrante hoc Perspicillo, non unum talem comitem, uti terra Copernico, sed omnino quatuor secum certè trahit, nunquam ipsum deserentes, interimq; suam singulos circulationem urgentes. Sed de his satis dictum in Dissertatione cum nuncio siderio. Tempus est, ut ad illa me vertam qua post editum Nuncium siderium, postq; dissertationem cum illo meam Perspicilli hujus usupatefacta sunt.

Annus jam vertitur, ex quo Galileus Pragam perscripsit, se novi quid in caelo prater priora deprehendisse. Et ne existeret, qui obtreclationis studio priorem se spectatorem ventitaret, spacium dedit propalandi, qua quisq; nova vidisset: ipse interim suum inventum literis transpositis in hunc modum descripsit.

S m a i s m r m i l m e p o e t a l e u m i d u n e n u g t t a u i r a s.

Ex hisce literis ego versum confeci semibarbarum, quem Narratiuncula mea inferui, mense septembri superioris anni.

Salve umbistineum geminatum Martia proles. Sed longissimè à sententia literarum aberravi; nihil illa de Marte continebat. Et ne te lector detineam, en detectionem Gryphi, ipsius Galilei authoris verbis.

Di Firenze li 13 di obre 1610.

Ma passando ad altro già che il. S. Keplero hà in questa sua ultima narrazione stampate le lettere che io mandai à V. S. Illma trasposte, venendo mi anco significato, come S. Ma. ne desidera il senso: ecco che io lo mando a V. S. Illma per parteciparlo con S. Ma. col S. Keplero, & con chi piacerà à V. S. Illma bramando io che lò sapi ogn' uno Le lettere dunque compinate nel loro vero senso dicono così.


Alcisi

Altissimum planetam tergeminum observavi. questo è, che Saturno con mia grandissima ammiratione ho osservato essere non una stella sola, mà tre insieme, le quali quasi si toccano; sono tra di loro totalmente immobili, & costituite in questa guisa ○○○. quella di mezzo è assai più grande delle laterali, sono situate una da oriente, & l'altra da occidente nella medesima linea retta à capello; non sono giustamente secondo la drittura del Zodiaco, mà la occidentale si eleva alquanto verso Borea, forse sono parallele all' Equinotiale: se si riguarderanno con un' Occhiale, che non sia di grandissima moltiplicazione, non appariranno 3 stelle ben distinte, mà parrà che Saturno sia una stella lunghetta in forma di una uliva, così. ○. ma servendosi di un' Occhiale, che moltiplichi piu di mille volte in superficie, si vedranno li 3 globi distintissimi, & che quasi si toccano, non aparendo trà essi maggior divisione di un sottil filo oscuro: Hor' euo trouata la corte à Giove, & due serui à questo vecchio, che l' aiutano à camminare, ne mai se gli staccano dal fianco: intorno à gl' altri Pianeti non ci è nouità alcuna. Etc.

Hac etsi parum abeunt à latina dictione veram tamen, ne quid lectorem remoretur. Sic igitur ille: sed ut ad alterum caput jam veniam, quod D. Keplerus in illa sua Narratione nupera typis exhibuit literas, quas ego transpositas ad Illustr. D. T. misi; cum & significatum mihi sit, cupere M. suam doceri sensum illarum; en illum ad Ill. D. T. transmitto, ut communicet eum cum M. S. cum D. Keplero & quo cum voluerit.

Literæ itaq; iter se connexæ ut oportet, hoc dicunt.

Altissimum planetam tergeminum observavi. Nimirum Saturnum summa cum admiratione deprehendi non unam solam esse stellam, sed tres inter se proximas, aded ut sese mutuo quasi contingant. Immobiles sunt inter se prorsus, & compositæ in hunc modum ○○○. Earum media multò est major extremis. Sitæ sunt ad orientem una, altera ad occidentem, in una recta linea ad pilum: Non tamen exactè secundum longitudinem Zodiaci: occidentalior enim assurgit non
nihil

nihil versus Boream, forte sunt aequinoctiali parallela. Si aspexeris illas per Oculare, quod non plurimum multiplicat; non apparebunt benè inter se distincta stella; sed videbitur stella Saturni longiuscula, forma Oliva, sic. . At si usus fueris Oculari quod plus quam millies multiplicat superficiem, apparebunt tres globi distinctissimè, & qui sese quasi tangant invicem; nec plus dirempti à se mutuo censebuntur, quam tenuissimi & vix conspicui fili latitudinè. Atq; inventum Iovi satellitium feniculo verò decrepito duos servos, qui incessum illius adjutent, nunquam à lateribus illius discedentes. Circa reliquos Planetas novi nihil comperi.

Hac Galileus. At ego si habeam arbitrium, non ex Saturno silicernium, ex socijs globulis servulos illi fecero; sed potius ex tribus illis junctis tricorporem Geryonem, ex Galilao Herculem, ex Periscopillo clavam; qua Galileus armatus illum altissimum planetarum & vicit, & ex penitissimis natura adytis extractum inq; Terras detractum nostrum omnium oculis exposuit. Lubet equidem nido detecto, contemplando quarere, quales in illo avicula: qualis vita, si qua vita, inter binos & binos globos sese mutuo penè contingentes; ubi non.

Tres cali spacium pateat non amplius ulnas, sed vix latum ungem in circulum undiq; dehiscat. An verè Astrologi Saturno tutelam metallariorum transcribunt, qui Talparum instar sub terris degere assueti liberum rarò hauriunt aërem sub dio. Etsi paulo tolerabiliores hic tenebra, quia Sol, qui tantus illis apparet quanta nobis in Terrâ Venus radios per discrimina globorum perpetuò trajicit, adeò, ut qui in globum alterum insistant, à reliquo velut à laqueari tecti; illi ab hujus sui tecti eminentijs, in lucem solis exporrectis, veluti à quibusdam titionibus desuper illuminentur. Sed adducenda frena menti liberis aetheris campis potita; si quid fortasse posteriores observationes diversum ab illa priore narratione, & immutatum tempore, renuncient.

Videbatur sibi Galileus in fine Epistolæ finem imposuisse narrationibus de planetis, novisq; circa eos observationibus, At semper perspi-

cax Oculus ille factitius, Perspicillum dico, brevi plura detexit: de quibus lege & sequentem Galilæi Epistolam.

Di Firenze le 11 di xbris 1610.

Sto con desiderio, attendendo la risposta a due mie scritte ultimamente, per sentire, quello che hauerà detto il S. Keplero della stranezza di Saturno. Si tanto gli mando la cifra di un altro particolare offeruato da me nuouamente, il quale se tira dietro la decisione di grandissime controuersie in astronomia, & in particolare contiene in se un gagliardo argomento per la constitutione Pythagorica & Copernicana; & à suo tempo publichero la deciferatione & altri particolari. Spero che hauerò trovato il metodo per definire i periodi de i quattro pianeti Medicei, stimati con gran ragione quasi inexplicabili dal S. Keplero, al quale piacerà, &c.

Le lettere trasposte sono queste.

Hac immatura à me jam frustra leguntur o y. Latine sic.

Expecto cum desiderio responsum ad postremas duas; ut resciscam, quid Keplerus, de Saturnie stelle miraculo, dicat.

Interim mitto illi gryphum noua cuiusdam eximiaq; obseruationis, qua facit ad decisionem magnarum in Astronomia controuersiarum, & in specie continet in se pulchrum argumentum pro Constitutione Mundi Pythagorica & Copernicana: tempore suo aperiam solutionem gryphi & singularia nonnulla alia. Spero inventam à me Methodum definiendi periodos quatuor Mediceorum; quas Keplerus non sine summa ratione existimavit inexplicabiles, &c.

Litera transposita sunt ista.

Hac immatura à me jam frustra leguntur, o. y.

Hactenus Galilaus. Quod si lector hac epistola desiderio implevit cognoscendi sententiam literis illis comprehensam: age & sequentem Galilæi legas Epistolam.

Prius tamen velim obiter animadvertas, quid Galilaus dicat constitutionem mundi Pythagoricam & Copernicanam. Digitum enim

intens-

intendit in meum *Mysterium cosmographicum*, ante annos 14 editum, in quo Orbium Planetariorum dimensiones ex *Astronomia Copernici* desumpsi qui Solem in medio stabilem, Terram & circa solem & circa suum axem facit mobilem: Illorum verò Orbium intervalla ostendi respondere quinq; Figuris regularibus Pythagoricis, jam olim ab hoc authore inter *Elementa mundi* distributis pulchro magis quam fœlici aut legitimo conatu: & quarum figurarum causâ *Euclides* totam suam geometriam scripsit.

Itaq; in illo *Mysterio* reperire est combinationem quandam *Astronomie* & *Geometriae* *Euclidea*; & per hanc utriusq; consummationem & perfectionem absolutissimam. Qua causa fuit, cur magno cum desiderio expectarem, quale nam *Galileus* argumentum esset allaturus pro hac mundi constitutione *Pythagorica*. Sequitur igitur de hoc argumento *Galilei* Epistola.

Illmo & Revermo sigre mio colmo.

E tempo che io deciferi à V. S. *Illma* & *Rma* & per lei al S. *Keplero* le luë trasposte, le quali alcune settimane sono, gli inuiati; è tempo dico già, che sono interissima mente chiaro del verità del fatto si che non ci resta un minimo scrupolo, ò dubbio. Sapranno dunque come circa 3 mesi fa vedendosi *Venerè* vespertina la cominciati ad osservare diligente mente con l'occhiale per veder col senso stesso, quello, di che non dubitaua l'intelletto. La uedi dunque sul principio di figura rotonda, pulita & terminata, mà molto piccola; di tal figura si mantenne sino che cominciò ad auuicinarsi alla sua massima digressione, tutta uia andò crescendo in mole. Cominciò poi à mancare dalla rotondita nella sua parte orientale & auersa il sole, & in pochi giorni si ridusse ad essere un mezo cerchio perfettissimo, & tale si mantenne senza punto alterarsi sin che incominciò à ritirarsi verso il sole allontanandosi dalla tangente: hora vâ calando dal mezo cerchio, et si mostra cornicolata, & andarà assettigliandosi sino al occultazione riducendosi allora con corse settilissime, quindi passando ad ap-

parizione mattutina, La uedremo pur falcata & sottilissima & con le corne auerse al sole, anderà poi crescendo sine alla massima digressione, doue sarà semicircolare, & tale senza alterarsi si manterrà molti giorni: & poi dal mezzo cerchio passerà presto al tutto tondo, & così rotonda si conserverà poi per molti mesi, mà è il suo diametro adesso circa cinque volte maggiore di quello chosi mostraua nella sua prima apparizione vespertina: della quale mirabile esperienza hauiamo sensata & certa dimostrazione di due gran questioni stati sin quì dubbie trà maggiori ingegni del mondo. L'una è che i pianeti tutti sono di loro natura tenebrosi (accadendo anco à Mercurio l'istesso che a Venere) L'altra, che Venere necessarissimamente si uolge intorno al Sole come anco Mercurio, & tutti li altri pianeti, cosa ben creduta da i Pittagorici, Copernico, Keplero & me. Ma non sensatamente prouata, come hora in Venere & in Mercurio; haueranno dunque il Sig. Kep. & gli altri Copernicani da gloriarsi di hauere creduto & filosofato bene, se bene si è toccato, & ci è per toccare ancora ad esser re putati dal uniuersalità de i filosofi in libris, per poco intendenti, & poco meno che stolti. Le parole dunque, che mandai trasposte, & che diceuano.

Hac immatura à me iam frustra leguntur, o. y. ordinate. Cynthia figuræ amulatur mater amorum. Cioè che Venere imitò le figure della luna.

Offeruati 3 notti sono, l'eclisse, nella quale non uì è cosa notabile, solo si uede il taglio del ombra indistinto, confuso, & comme annubiato, & questo per deriuare essa ombra da la Terra lontanissimamente da essa D.

Voleua scriuere altri particolari. Ma sendo stato trattenuto molto da alcuni gentilhuomini & essendo l' hora tardissima. son forzato à finire. Favoriscami salutate in mio nome i Ss. Kep. Asdale & Segheti, & à V. S. Ill^{ma} con ogni reua baciole mani, & dal S. Dio gli prego felicità. Di Firenze il primo di Gennaio Anno 1611.

Di V. S. Ill^{ma} & Reuma

Serie. Obligmo.

Galileo Galilei.

Hæc Epistola Galilæi, cujus summam cape latinis verbis.

Tempus est ut aperiã rationem legendi literas, quas ante aliquos septimanas misi transpositas. Tempus inquam nunc est, postquam de re ipsa sum certissimus factus, sic ut ne tantillum amplius dubitem. Scias igitur quod circiter tres menses à quibus Veneris stella videri potuit, inceperim per Oculare ad illam cum diligentia respicere; ut quod mente tenebam indubium, ipso etiam sensu comprehenderem. Principio igitur Venus apparuit figurâ circulari perfectâ, eâq; exactâ & evidenti termino inclusâ, verum exili admodum: hanc figuram Venus retinuit tantisper, dum cepit appropinquare maximæ suæ digressioni à Sole, interimq; continuè crescebat mole corporis apparenti. Ex eo cepit à rotunditate deficere à plaga orientis, quæ à Sole erat aversa, & intra paucos dies collegit omnem speciem intra semicirculum perfectissimum; ea figura durabat sine mutatione vel minima, quo ad usq; cepit sese ad Solem recipere, deserta Tangente sui Epicycli: hoc jam tempore magis magisq; deficit à figura semicirculari, pergetq; diminuendo illam usq; ad suam occultationem, quando in subtilissimum cornu deficiet. Ex eo transitu factò ad apparitionem matutinam apparebit nobis tantummodo falcata, & subtilissimo cum cornu à Sole aversa; postea magis magisq; implebitur cornu usq; ad Maximam digressionem à Sole, in qua semicirculus apparebit, eaq; figura sine notabili variatione durabit dies multos: deinde ex semicirculari paulatim totum implebit orbem, eamq; perfectè circula rem figuram in menses bene multos conservabit. Caterum in præsens diameter corporis Veneris circiter quinq; vicibus major est eâ, quam monstravit in prima apparitione Vespertina. Ex hac mirabili observatione suppetit nobis certissima & sensu ipso perceptibilis demonstratio duarum maximarum questionum, quæ ad hunc usq; diem à maximis ingenijs agitabantur in partem utramq;. Vna est, quod planeta omnes natura sua tenebrosa sunt corpora (ut de Mercurio jam eadem concipiamus, quæ de Venere), altera, quod summa nos urget necessitas, ut dicamus.

Argumen-
tū autho-
ris de situ
Veneris &
Mercurij
orbis cit-
ca Solem,
qualis est
inconsti-
tutione
Mundi
Coperni-
cana & Py-
thagorica,
simplici-
ter accipi-
o, nec quic-
quam ad-
do: nisi
quod Pe-
na gratu-
lor, qui is-
dem supra
alio imbec-
cilliori ar-
gumento
probaue-
rat.

Venerem (in superg. & Mercurium) circa Solem circumferri, ut & reliqui omnes planeta: res credita quidem Pythagoricis, Copernico, & Keplero, nunquam vero sensu comprobata, ut nunc in Venere & Mercurio. Habent igitur Keplerus & reliqui Copernicani, quo glorientur se bene philosophatos esse, nec vanam esse eorum credulitatem: quantumvis evenerit illis, possitq; evenire etiam porro, ut à Philosophis hujus temporis, qui in libris philosophantur universali consensu stupidi & paulò minus quàm fatui reputentur.

Dictiones igitur quas misit literis transpositis, & qua sic dicebant, [Hæc immatura à me jam frustra leguntur o. y.] redacta in suam ordinem, sic sonant. [Cynthiæ figuras æmulatur mater amorum] id est, Venus imitatur figuras Luna.

Tres noctes sunt, cum observavi Eclipsin Luna, in qua non occurrit notabile quippiam. Tantummodo meta umbra indistincta confusa & veluti obnubilata apparuit; causa quia consurgit umbra à Terra, longissimè à Luna corpore.

Habebam & alia singularia, sed impediòr, quo minus de ijs scribam, &c. Hactenus Galilæus.

Quid nunc, amice lector, ex Perspicillo nostro faciemus? num Mercurij caduceum, qua freti liquidum tranemus athera, & cum Luciano coloniam deducamus in desertum Hesperum, amenitate regionis illecti? An magis sagittam Cupidinis, qua per oculos illapsa mens intima vulnere accepto in Veneris amorem exardescat? Nam quid ego non dicam de admirabili hujus globi pulchritudine, si proprio lumine carens, solo Solis mutuatio lumine in tantum splendorem datur, quantum non habet Iupiter, non Luna aequali secum Solis vicinitate gaudens; cujus lumen si ad Veneris lumen comparetur, majus quidem ob apparentem corporis magnitudinem. at iners mortuum & veluti plumbeum videbitur. O verè auream Venerem; quæquam ne dubitabit amplius, totum Veneris globum ex puro puto auro politissimè fabricatum: cujus in sole posita superficies adeo vegetum revibrat splendorem? Accedant nunc mea experimenta de alterabili Veneris lumine ad ni-

23

ad nictum oculi; quæ in Astronomia parte optica recensui: Ratio nihil aliud colligere poterit, nisi hoc, Veneris stellã rapidissima gyratione circa suum axem convolvi, differentes suæ superficiei partes, & luminis solaris minus magisq; receptoras alias post alias explicantem.

Lubet verò etiam Astrologorum cum voluptate mirari sollertiam, qui à tot jam sæculis exploratum habebant, Amores & fastus amasiarũ, moresq; & ingenia amantium ab hac Veneris stella gubernari. Scilicet Venus cornuta non sit, quæ tot cornutos quotidie efficit; quoties ad exoptatos amplexus sese demittens subito ex oculis & libero conspectu amantis sub fastuosos Solis radios velut ad alterum virum recurrit, frustrata amantium desideria. Mirum equidem erat Venerem non ipsam etiam, ut Lunam, τικτιδου: cum amores Venerei sola & unica pariendi causa sint. Ecce igitur ut formosissima stellarum, perfectò circulo sui aspectus, veluti quodam fœtu maturo deposito, sese demittat ad imum Epicycli sui, adq; viciniam Telluris, inanis & in cornu attenuata, veluti novæ prolis concipiendæ causa; & postquam Soli copulata fuerit, ipsa Soli veluti viro suo inferiori loco sese subjiciens, ut fert mos & natura feminarum; exinde paulatim ex altero latere sese rursus tollat in altum, & magis atq; magis, veluti imprægnata intumescat; donec decimo mense à conceptione (tantum enim plane interest inter binas conjunctiones ☉ & ♀), plenum uterum plenum inquam aspectus sui circum in summitatem Epicycli, supraq; Solem adducat, eiq; rursus conjuncta, veluti genuino patri fœtum suum domum referat.

Sed satis ratiocinationũ mearum. Audiamus nunc Epilogi loco etiã Galilæi Ratiocinationẽ ex omnibus quæ attulit Perspicilli experimentis extractam. Sic ille denuo.

Illmo & Reumo Sigre Colmo

Ho riceuuto gusto & contẽto particolariss: nella lettura dell' ultima di V. S. Illma & Reuma delli 7 stante, & in particolare in quella parte doue ella mi accẽna la fauoreuole inclinazione dell' Illmo Sig. Cons. VVacker verso di me; la quale io infinitamẽte stimo & apprezzo; & poi che quella hà principalmẽte origine dall' hauere in incontrati offeruazioni necessariamẽte dimostrati cõclusioni per auanti tenuti vere da sua Sig. Ill.

per

per confermarmi maggiormente il possesso di grazia tanto pregiata da me, prego V. S. Ill^{ma} à fargli intendere per mia parte, come conforme alla credenza di Sig^{ra} Ill^{ma} ho demonstratione certa, che si come tutti i Pianeti ricevono il lume dal Sole essendo per se stessi tenebrosi & opachi; così le stelle fisse risplendono per loro natura, non bisognose della illustrazione de i raggi solari, li quali, dio sa, se arrivano a tanta altezza, piu di quello, che arriva noi il lume di una di esse fisse. Il principale fondamento del mio discorso è nell' offeruare io molto evidentemente con, l' occhiali, che quelli pianeti di mano in mano che si trouano piu vicini a noi, ò ab Sole, ricevono maggiore splendore, & piu illustremente celo riverberano; & perciò Marte perigeo, & a noi viciniss: si vede assai piu splendido che Giove: benchè a quello di mole assai inferiore, & difficilmente se gli può con l' occhiale leuare quella irradiazione, che impedisce il uedere il suo disco terminato, & rotondo; il che in Giove non accade, vedendosi esquisitamente circolato; Saturno poi per la sua gran lontananza si vede essatamente terminato, si la stella maggiore di mezo comme le due laterale piccoliss: & appare il suo lume languido & abacinato, senza niuna irradiazione, che impedisca il distinguere i suoi 3 piccoli globi terminatissimi. Hora poiche apertissima mente veggiamo, che il sole molto splendidamente illustra Marte vicino, & che molto piu languido è il lume di Giove (se ben senza lo strumento appare assai chiaro, il che auade per la grandezza, & candore della stella) languidissimo & fosco quello di Saturno, come molto piu lontane: quali doueriano apparisci le stelle fisse lontane indicibilmente piu di Saturno, quando il lume loro deriuasse dal Sole? Certamente debolissimo, torbido e smorto. Ma tutto l' opposto si vede, però che se rimireremo per essempio il Cane, incontreremo un fulgore viuissimo, che quasi ci toglie la vista con una vibrazione di raggi tanto fiera, & possente che in comparazione di quello rimangano i pianeti, e duo Giove & Venere stessa, come un impurissimo uetro appresso un limpidissimo & finissimo Diamante: Et benchè il disco di esso

Cane

Cane apparisca non maggiore della cinquantesima parte di quello di Giove, tutta uia la sua irradiazione è grande & fiera in modo che l'istesso globo trà i proprij crini si implica & quasi si perde, & con qualche difficoltà si distingue, doue che Giove \ e molto piu Saturno \ si veggono & terminati, & di una luce languida, & per così dire quieta. Et per tanto io stimo che bene filosoferemo, referendo la causa della scintillazione delle stelle fisse, al vibrare, che elle fanno dello splendore proprio & natiuo dal intima loro sustanza, doue che nella superficie de i pianeti termina piu presto, & si finisce la illuminazione, che dal Sole deriuu & si parte. Se io sentiro qualche particolare questione ricenata dal medesimo S. VVackher, non resterò di affaticarmi intorno per dimostrarvi, quale io sono desiderosiss: di seruire un tanto Signoro, & non già con speranza di aggiugnere al tormine conseguito dal suo discorso, perche benissimo comprendo che a quanto sià passato per il finiss: cribro del guidizio suo, & del S. Keplero, non si può aggiugnere di esquisitezza, ne iò pretenderei altro che col dubitare, e mal filosofare eccitargli al ritrouamento di nuoue sottigliezze, Gl' ingegni singolari che in gran numero floriscono nell' Alemagna mi hanno lungo tempo tenuto in desiderio di vederla, il quod desiderio hora si raddoppia per la nuoua grazia dell' Ill^{mo} VVackher la quale mi farebbe diuēni grande ogni piccola occasione, che mi si presentasse. Ma hò di souerchio occupata V. S. Ill^{ma} & Reu^{ma} degnisi per fine di offerirmi & dedicarmi deuot^{mo} serue all' Ill^{mo} S. VVackher, salutando anco caramente il S. Keplero, & a lei con ogni reuza baciolemani & dal Sigre dio le prego somma felicità. di Firenze li 26 di Marzo 1611.

Gallileo de' Gallilei.

Latino stylo sensus hic est.

Mirifice me delectarunt ultima tua litera, præcipuè ubi de Illustris D. Consiliarij Casarei D. VVagherij beneuolo in me animo testantur: quam ego quidem maximi facio. Qua cum inde sit orta, quod Observationibus Ego nonnullis necessaria ratione demonstravi conclusa
d qua-

quaedam; quæ ipse pridem pro veris habuerat: ut igitur hanc mihi possessionem gratiæ tam chara firmiorem efficiam: rogo illi hæc à me nuncies: esse mihi demonstrationes certissimas in promptu, quod, planè ut Ipse tenet, Planeta quidem omnes lumen à Sole recipiant, ipsi suâ naturâ corpora tenebrosa & opaca; Fixæ verò stelle proprio & naturali lumine resplendeant, non indigentes illustratione à Solis radijs: quippe qui, an ad fixarum altissimam regionem in tanta etiam claritate pertingant, quantulâ claritate inde ad nos descendunt fixarum radij, Deus novit. Potissimum ratiocinationis meæ fundamentum in hoc consistit, quod cum Oculari evidenter observavi, Planetas, ut quisq; quolibet tempore nobis & Soli vicinior fuerit, sic majoreus recipere splendorem, & illustrius eundem reverberare: itaq; Mars perigæus, terris nimirum vicinissimus splendore Iovem non exiguo intervallo post se relinquit, quantumvis mole corporis ipsa, Iovi longè cedat. Adeoq; difficile est radiationem hanc Martis Oculari excipere; tanta enim est, ut impediatur visum, quo minus is discum corporis stelle Martia rotundè terminatum internoscere possit. Id in Iove non usu venit, apparet enim exquisite circularis. Post hunc Saturnus propter eandem suâ eamq; longissimam remotionem, apparet exactissimè terminatus; tam major globus in medio, quam dua ejus pilula minuta ad latera. Apparet enim lumine languido & fracto, sine irradiatione tali, quæ impediatur distinctam trium ejus terminatissimorum globulorum apprehensionem. Cum igitur videamus Martem de propinquo valde splendide illustrari à Sole Iovis remotioris lumen multo esse languidius (quantūvis citra instrumenti usum satis id clarum appareat, id quod accidit ei propter magnitudinem & candorem corporis) Saturni remotissimi languidissimum & veluti aqueum: quale, putas, fixarum lumen esset appariturum quæ ineffabili intervallo longius quàm Saturnus, à Sole absunt, si à Sole tantum illustrarentur? Ominò debilissimum, turbidum & emortuum. Atqui planè contrarium experimur. Lustremus enim oculis, exempli causa, stellam Canis; occurret nobis fulgor vivi-
 dissimus.

diffimus, qui veluti pungit oculum, cum vibratione Radiorum rapidissima, tanti vigoris, ut ad illum comparati planetae, puta Iupiter, ipsaq; adeo Venus, sic confundantur & deprimantur, ut vitrum vilissimum & impurum, comparatum ad tersissimum & illustrissimum Adamantē.

Et quamvis stelle Canis discus non major appareat quinquagesimā particulā disci Iovis: nihilo secius radiatio ejus est ingens & violenta admodum, adeo ut species ista disci sese intra crines veluti radiationis suae recondat, implicet, & quasi evanescat, nec nisi cum difficultate aliqua discernatur à circumfusis crinibus: ubi contrā Iupiter, & multo magis Saturnus, videntur terminati lux eorum languida, & ut ita dicam, quieta. Quapropter existimo rectē nos philosophaturos, si causam scintillationis fixarum referamus ad vibrationem splendoris proprii & nativi, in substantiam eorum insiti: vicissim in superficie planetarum dicamus terminari de propinquo illuminationem illam, quae à Sole derivata in mundum diditur. Haec scientitica sunt in Galilaei literis, caetera mitto. Vides igitur, lector studiosè, quomodo Galilaei, praestantissimi me hercule philosophi sollertissima mens, Per spicillo hoc nostro, veluti scalis quibusdam usa, ipsa ultima & altissima Mundi aetabilis mœnia conscendat, omnia coram lustret, indeq; ad nostra haec tuguriola, ad globos inquam planetarios argutissimo ratiocinio despiciat, extrema intimis, summa imis solido iudicio comparans.

Quia verò nunquam desunt in philosophia Rationum inter se studia aut obrectationes: multiq; per Germaniam Germanorum hic testimonia requisituri sunt: age illis de rebus iisdem etiam Germani cuiusdam Epistolam exhibeo: ex qua simul & illud patebit; non malè factum à Galileo, quod rerum suarum satagens, inventa sua maturè, per gryphos tamen Pragae nobiscum communicaverit.

Sic igitur Marius ad cōmunē nostrum Amicum: Interim aliud tento opus: in quo primum immobilitatem Terrae assero, omnis omnino personalibus: sed argumenta solum examinantur contra rationes Copernicanas, quas nostro tempore Keplerus cum Galileo Patavino

a. Liberavit Keplerū metu: qui valde scilicet, honori suo metuebat, si Marius motui Terrae intercessisset cum sui nominis mentione.

b. Primū
victoriae
omen ante
pugnam,
quod Ma-
rius impe-
ritiā homi-
num, sectae
huius am-
plitudinē
intra duos
restringit,
quae jam
penē pub-
lica est: ni-
si flos o-
mnis do-
ctorū ho-
minum in-
tra Acade-
miarum
septa sit
cōclusus.
c. Obfistite
Theologi,
rem imper-
tinentem
aggredi-
tur; autho-
ritatem
Scripturae
abutum it-
d. Cerna-
mur agen-
do.

*Mathematico approbat, & serid sic se habere statuit b. Argumenta
mea assertionis ex sacris assumo; c à stipulante etiam physicā d & Astro-
nomiā. Deinde refutabitur opinio eorum, qui corpora caelestia aded
monstrosc molis esse putarunt: & noua verisimilior dimensio quanti-
tatis à me tradetur: qua in re me plurimum iuuit instrumentum Bel-
gicum, Perspicillum vulgò vocatum. Tertid demonstrabo, Venerem
non secus illuminari à Sole, eamq; Corniculatam, διχοτομον, &c. reddi,
prout à fine anni superioris, e usq; in Aprilem presentis à me ope perspi-
cilli Belgici multoties & diligentissimè observata & visa est, quando
Venus proxima Terra erat, cum occidentalis, tum orientalis. Quartò
agam de novis planetis Iovialibus, qui circa Iovem feruntur, ut plane-
ta reliqui circa Solem, in aequali tamen interstitio & periodo. Duorum
extremorum periodos jam indagavi, tabulasq; construxi ut inde omni
tempore facilimè sciri possit quot minutis distent à Ioue ad dextram
sinistramve. Haecq; duo capita ultima sunt plane inaudita omni aeo.
Forsan alia etiam interim dum laboro, occurrent. Hucusq; Marius.*

*Habes igitur, amice lector, confirmatam perspicilli fidem in obser-
uatione novorum caelestium, unius insuper Germani testimonio. Quid
impediat igitur me praestantissimo instrumento Panegyricum hoc libel-
lo pangere Geometricum, teq; lector, honoris causa, presenti animo, &
non vulgari mentis attentione; dum eum ego recito, interesse. Qua
opera & ingenium acues, & causarum perceptione evades in philoso-
phia doctior, ad mechanicam & rerum utilium atq; jucundarum in-
ventionem instructior, deniq; à mille modis quibus vulgus in errorem
solet induci, cautior atq; tutior. Vale & hoc praludium aequi boniq;
consule.*

e. Quò ipso tempore Galilaus Florentia Pragam scripsit de Matre
amorum, & hæc Mario sic ordine apparitura jam tunc prædixit.

sint bene complanata, bina latera ex fundo *H* assurgentia rectis angulis, ut sint *B E H*, & reliqui recti: & pellucidum angulo extenti in capuli angulum cavum sedeat penitus, eum explens. Promineat autem latus capuli *D C* ultra terminum lateris pellucidi *D B*, aliquantulo spacio *B C*, Altitudine verò *B E* sint ambo equalia, & supra sit superficies quasi una pellucidi & opaci.

Quo factò, & corporibus conjunctis latus *D C*, quod particulâ *D B* utriq; corpori est commune, obijciatur perpendiculariter Solis radijs, in quacunq; inclinatione plani *B A* ad eosdem radios.

Sint radij Solis *L D*, *M B*, *N C*. Ex quibus qui sunt inter *M B H* & *N C*, quia nullum occurrit ipsis corpus pellucidum præter aërem, ij trans *B C* tendent in directum *M B H*, *N C K*. Itaq; *C B* projiciet umbram *H K* in fundum capuli, & aliquando in eius latus oppositum.

Hic igitur ex proportione *B E* altitudinis, ad *E H* umbram, habetur declinatio Solis à vertice planiciei *B A*. Nam ut *B E* ad *E H*, sic Sinus Totus ad Tangentem distantia Solis à vertice plani *B A*: id est anguli *E B H*.

Qui verò radij Solis cadunt inter *M B*, & *L D*, ij in densiorem pellucidam superficiem *B A* incidentes, refringentur versus perpendicularem *B E*, & sic *M B* refringetur in *B G*: & *L D* in *D I*. Et *B D* trans Crystallum projiciet umbram in *G I*, brevioram. Poterit autem oculis notari quantitas, si prius fundus capuli divisus fuerit atramento in partes certas. Nam corpus, quod fundum tegit, est pellucidum.

Rursum igitur, ut *B E* altitudo, ad *E G* umbram, sic Sinus Totus ad Tangentem anguli *E B G*.


Subtracto autem *E B G* hic invento, ab *E B H* prius invento, restat *G B H*, quantitas anguli refractorij in hac inclinatione *E B H*.

V. PROBLEMA.

Refractiones inclinationum majorum, & simul priores aliâ viâ commodius probare.

Fiat.

Fiat ex lamina pellucida satis crassa, utpote dimidij digiti crassitudine, corpus cylindraceum. Id sit $A G$; Crassitudo $F A$. Perforetur lamina secundum ductum diametri Circuli, ut sit $F A$ foramen longum per C centrum in G exiens, aut loco foraminis regula super Cylindraceo figuratur secundum ductum $A C G$, dioptris aequè altis in A & G . Dividatur limbus circularis in partes 360, initio factò ab E , ut $A E$ sit Quadrans.



Dirigatur autem foramen vel dioptra $A G$ in Solem, & sit lux Solis per A ingressa, ultra G , opposito in loco vel pariete conspicua. Cum igitur semicirculus totus una vice illuminetur, quadrante utrinque ab A porrectus, patet quod ducta contingens ipsam cylindri superficiem in E , quae sit $D E$, parallela sit ad $A G$, & sic ex Sole veniat, extremus radius existens eorum, qui in cylindri semicirculum incidunt.

Itaque circumduc stylum opacum super Cylindracea superficie ab $A F$ usque in E , & observa ubi cadat eius umbra in opposito margine circa partes $G B$. Esto ut, cum in E ponitur, umbra cadat in B . Dimidium ergò circumferentiae $E B$, metitur angulum refractionis radij $D E$, qui habet declinationem maximam à vertice, quippe tangit Crystalli Cylindricam superficiem in E .

VI. AXIOMA.

Crystalli & vitri refractiones sunt proximè eadem.

VII. AXIOMA.

Crystalli refractiones usque ad tricesimum inclinationis, sunt ad sensum proportionales inclinationibus.

IX. AXIOMA.

Angulus refractionis in Crystallo est usque ad dictum terminum,

4
minum, quàm proximè tertia pars inclinationis in aëre.

IX. AXIOMA.

Refraçtio Cryſtalli maxima eſt circiter 48. gradus.

X. AXIOMA OPTICVM.

Inclinatio cauſatur refractionem, & radiorum in eodem medio conſtitutorum inclinationes æquales, cauſantur & refractiones ſeu refractionum angulos æquales, inclinatio maior, etiam refractionem maiorem; nulla nullam: hoc eſt, perpendicularis non refringitur.

XI. AXIOMA OPTICVM.

Radij à diuerſis punctis lucentibus in idem ſuperficieſi denſioris punctum incidentes ſe mutuò ſecant, & incidentium ſitus permutatur in refractis; non minus ac ſi ſectio contingeret ſine refractione.

Probatur in Opt. per X.

XII. PROPOSITIO.

Refractiones exquisitè penſitatæ non ſunt proportionales inclinationibus in aëre.


Nam per VIII. cum eſt inclinatio 30°. refraçtio eſt 10°. Triplica utrumq;. Ergò in hac proportione inclinationi 90°. deberetur refraçtio 30°; at experientia per IX. dat 48°.

XIII. PROPOSITIO.

Nullus radius, qui intra corpus Cryſtalli ſuper unam ejus ſuperficieſi plus 42°. inclinatur, à vertice poterit illam ſuperficieſi penetrare.

In Schemate ſit corpus cryſtalli AC, ſuperficieſi plena FCO, ſuper hanc inclinetur AC plus quàm 42°, Erit igitur FCA, minor quàm 48°. quod ſi AC exit in aërem, refractus in aëre foris aut continget ſuperficieſi


perficiem in CO, aut non continget, sed elevabitur supra eam, ut si sit CG. At neutrum possibile est. Nam per IX. ipsius CO contingentis refractionis est 48°. igitur ipsius OC refractus est CH, interior quam CA, quia FCA ponitur minor quam 48°. Quia igitur OC refringitur in CH, non in CA, nec igitur AC in CO refringetur per III. Sed nec GC in CA refringitur. Nam per XI. GC & OC in idem C punctum venientes secant se, & GC superioris quam OC refractus fit inferior quam CH, non ergo superior CA. Nequit igitur AC transire C.



XIV. PROPOSITIO. PROBLEMA.

Vmbras contra Solem projicere.

Præstat hoc Cubus Crystallinus. Sit enim FO cubus & Bβ Sol. Aω corpusculum in superficie cubi FA. Radij igitur BA, βω, qui umbram extrinsecus ambientes formant, refringuntur in AC, ωx. Et CA, xω necessarîo plus quam 48°. elewantur supra puncta superficiei Aω, per IX. Cum autem angulus Cubi AFC sit rectus, & CAF sit plus quam 48°; erit FCA minus quam 42°. Plus igitur quam 48°. & sic plus etiam quam 42°. inclinatur AC & ωx à vertice superficiei CF. Quare per XIII. ACωx non penetrabunt superficiei FC. Quare per Optica principia, toti repercutientur in OD superficiei, & angulis quidem equalibus ACF, DCO. Et quia COD angulus cubi rectus est, & DCO (equalis ipsi ACF) minor quam 42°. igitur CDO plus erit, quam 48°; minus igitur quam 42°, inclinatur à vertice superficiei DO; ideoq; exire potest in E; Sic xδ in ε. Et sic umbra ipsius Aω cadit in Eε contrario situ, fitq; Soli propior quam corpus Aω, longius productis DE, δε.




Eodem modo demonstrari potest, si in ω collocetur erecta turricula, $\omega \theta$, umbra culmen E contra Solem conversum iri.

XV. PROPOSITIO.

Radij penetrare possunt angulum linearem Prismatis triangulo æquilatelo formati ex vitro vel Crystallo.

Sit intra Prisma sectio ABC æquilatera. Duc ipsi BC parallelam DE , quæ sit radius aliquis. Dico ei patere exitum utrobique & in D & in E in aërem. Est enim ABC , ac proinde & ADE gr. 60 . Complementum seu distantia à vertice D puncti in DA superficie est 30° , minus quàm 42° . Exhibit igitur ED in DF . Sic etiam è regione exhibit DE in G .




XVI. AXIOMA SENSUALE.

Colores Iridis jucundissimi oriuntur, cum refraçtio est tanta: idq; tam si oculi transpiciant, quàm si Sol transluceat.

XVII.

Sole prisma irradiante tria genera radiorum resultant, Sincerus, Vitri colore, & Iridis coloribus.

Sit enim F . Sol Is radiet in D . Hic quasi dividitur radij Solaris densitas, quæ minimâ sui parte repercutitur in DI , & anguli ADI , æquali ipsi BDI , quo illabitur. Sincerus igitur radius, sed tenuem per DI vibrat in I . Sincerus est, quia in vitro tinçtus non est: cuius corpus non ingreditur.



Potior autem pars de densitate ipsius FD penetrat D & refringitur in DE . In E verò rursum dividitur, ratio-
ne

ne densitatis. Potior enim pars transit E, & propter geminam magnam refractionem colores Iridis jaculatur in G.

Residuum ipsius DE tenne admodum repercutitur à superficie AC in EM; quòd si DE paulò obliquius in AE incidit, obliquius igitur in EM refringitur quàm hic. Nam si minuas DEA, erit & minuendus MEC, ex lege repercussus. Et sic deniq; EM in BC rectus incidet, itaq; nihil in M refringetur. Cum autem FD hoc pacto bis pertransierit corpus vitri, quippe semel in DE, iterum in EM, exiens rectà per M, radium vitri colore jaculatur in K, rectius tamen è regione ipsius A. Nam docemur ex Opticis, radios lucidos tingi in medijs coloratis.

XIIX, PROPOSITIO.

Si Crystallini vel vitrei corporis angulus rectus fuerit; ille inter oculum & visibile positus non transmittet radios visibilis ad oculum, sed superficies Crystalli contra visibile posita, putabitur opaca, & colorata colore corporis.

Sit enim radius CA intra corpus, is aut æqualiter inclinabitur super superficies FC, FA, aut inæqualiter. Si æqualiter, plus igitur quàm 42°. inclinabitur, quippe 45°. non igitur transibit vel unam, vel alteram per XIII. quod si inæqualiter, demonstratum est prop. XIII. quod unam earum non transeat. Non transit igitur ullus radius simul utramq; superficiem recti anguli Crystallini corporis.



XIX, AXIOMA OPTICVM.

Locus rei æstimatur ex plagâ in quam visorius radius ex oculo primum exit; quicquid jam in medio itinere inter rem & oculum in hac plagâ per refractionem radij mutetur. Quia nequit oculus percipere, quid radijs per occursum mediorum extra

8
extra se accidat : sed putat illos pergere in eandem semper plagam, uti cœperant.

XX. PROPOSITIO.

Prismatis angulo supino, quæ sunt contra, videntur supra, prono infra, dextro dextra, sinistro sinistra.

Resumatur prior delineatio prop. XVII. & esto Supinus A, Oculus F, Ergo FD fertur in DE, & in D 20°. gradibus (per XVI:) declinat à viâ DH. Amplius DE fertur in EG per alios 20°. declinans à viâ DE & sic per 40°. à viâ FDH: quod est penè semissis Anguli recti. Cum tamen oculus F, quæ sunt in G, infra putet se videre in H supra per XIX.

Haftenus de plano Crystallo : nunc de Curvilineis :
Primum de Luce.

XXI. DEFINITIO.

Motus lucis ad locum exprimaturo voce vergere. Convergere dicuntur radij, quando progrediendo à fonte, coeunt inter se magis & magis. Divergere quando à fonte progrediendo digrediuntur magis & magis à se invicem. Itaq; qui convergunt, ij post concursum sectione facta porrò divergunt.

XXII. DEFINITIO.

Puncta radiantia longinqua vel remota dicuntur, quæ tanto absunt intervallo, ut pupillæ oculi diameter ad illud collata evanescat : propinqua verò, quando sensibilis est proportio pupillaris diametri ad intervallum.

XXIII. POSTULATIVUM.

Punctum aliquod rei visibilis longinquum, licet radiet in orbem


orbem undique, respectu tamen oculi aut perspicilli, ad quorum diametros distantia nullam habet sensibilem proportionem, radios extrema oculi vel perspicilli contingentes, ponitur mittere parallelos, quorum unus solus perpendicularis esse potest in occurrentem superficiem curvam.

XXIV. DEFINITIO.

Vnius ergò puncti de re visibili propinquâ radij diuergunt versus pupillam oculi: plurium verò punctorum de quocunq; visibili radij singuli, conuergunt versus centrum visus. Et hoc si radiatio sit libera. Valdè igitur notandum, quando de radiatione agatur unius puncti, & quando de plurium punctorum radiationibus inter se comparatis.

CD, CA, CE diuergunt versus oculum DE: sic etiam BD, BA, BE & omnes medij: At BA, CA, conuergunt versus centrum oculi A.

B | C



De Lente.

XXV. DEFINITIO.

Lens est vitrum aut crySTALLUS in formâ disci orbicularis, latior, quàm profundior.

XXVI.

Conuexa lens est, quæ, vel utraq; , vel unâ solâ superficie convexa est, reliquâ plana.

Idem intellige de cavâ. Vtraque etiam communi vocabulo pura dicatur.

XXVII.

Mixta, quæ alterâ superficie est convexa, reliquâ cava: perfectio utrimq; circulo; quæ scilicet est Puris opposita.

D | E
A

B

Conue-

XXIX.

Convexum, cavum, mixtum, in genere Neutro intelligitur Perspicillum, vitrum, corpus, &c. sonatq; idem quod lens convexa, cava, mixta, &c.

XXX.

Alia est magnitudo lentis per se, alia convexitatis aut cavitatis in lente. Illa corporis est magnitudo, hæc figuræ.

XXXI.

Hæc ipsius corporis magnitudo geminum habet respectum. Aut enim est absoluta, ut cum ipsi lentium orbis seu disci æstimantur, interq; se comparantur: aut refertur ad circulum suæ convexitatis; quota nimirum pars sit lens de suæ convexitatis circulo.

XXXII.

Convexum aut cavum parvo vel magno circulo; sive convexum aut cavum parvi vel magni circuli, intelligitur non de corpore, sed de figurâ & conformatione.

XXXIII.

Parvi circuli convexitas aut cavitas est magna; magni parva.

XXXIII. Postulatum.

Vt convexi, concavi, vel mixti superficies utraq; centrum sui circuli habeat in eadem lineâ, quæ per medium lentis umbilicum transeat.

Lentis concursus.

XXXIV.

PROPOSITIO.

Si punctum mittit parallelos in lentem convexam portionis minoris quam sunt 30° , perpendiculariter objectam, et si nihil præterea accadat radijs: quam quod in ingressu refringuntur: tunc manente solo illo radio irrefracto, qui per centrum transit spheræ, perpendiculariter incidens in superficiem, cæteri refractionem passi, concurrunt cum perpendiculari post sesquidiametrum spheræ circiter.

Sic

Sit aliquod punctum longinquum, quod irradiet sphaera crystallina portionem BD . Et sit BCD minor 30° . Radiatio igitur erit parallela per $XXIII$. Horum radiorum solus IC sit perpendicularis, quippe per centrum A transiens.


Sumatur praeter perpendicularem IC , unus parallelorum in aëre quicumq; sit HG . Quia ergo HG obliquè incidit in superficiem BGC , per II refringetur versus perpendicularem ex G puncto incidentia, qua sit GA , sic ut infra G non amplius paralleli sint IC & HG . Concurrent igitur. Sit concursus in F , & HG in GF refringatur. Nam ipsi HG post G nihil amplius accidere fingitur. Dico igitur AF esse ipsius CA Duplam, & sic esse diametrum sphaera BCD . Inclinator enim HG , qui est parallelus perpendiculari IC , quantitate anguli GAC . Quod si refractio esset aequalis inclinationi, tunc HG in GA , scilicet in centrum ipsum refringeretur. Sed quia refractio non est aequalis, nec est tres tertiae partes inclinationis, sed una tertia, per $VIII$: ergo refractus GF à GA declinat duabus tertijs inclinationis GAC . Est ergo FGA de GAC dua tertia. At juncti AGF & AFG aequat GAC . Ergo GFA est una tertia ipsius GAC , dimidiumq; ipsius FGA . Ut ergo sinus GFA dimidij ad FGA dupli anguli sinum, ita GA ad AF , ex doctrina Triangulorum. Sed sinus angulorum minorum quam 15° . sunt ferè proportionales ipsis angulis seu arcibus. Ergo sunt ferè in ratione dupla. Quare etiam GA vel CA ad AF est ut unum ad duo, seu ut semidiameter ad diametrum, & sic CF est ferè sesquidiameter.



XXXV. PROPOSITIO.

Si paralleli radij inceserint intra corpus crystallo convexi: ij foris ferè diametro convexitatis infra convexum concurrent cum perpendiculari, dummodo portio minor sit quàm 30°.

Sit corpus Crystallo P O R, terminatum convexo P Q R: & per hoc corpus incedant aliqui Paralleli, quorum medius & perpendicularis sit O Q. Caterorum unus sit T R. Dico primum T R in R S foras refringi angulo refractionis dimidio minori, quàm est inclinatio, ut quia S R X, T R O sunt inclinationes Radiorum S R, & T R: qualium igitur T R O habet partes duas, talium S R X habere tres. Est enim refractionis angulus tertia pars inclinationis per VIII. Cum igitur S R in ingressu refringatur in R T: R T etiam in exitu refringetur in S R per III. Dimidium igitur inclinationis T R O est refractione ipsius T R, cum è denso exit. Dico amplius R S, integra ferè diametro circuli P Q R concurrere cum O Q. Nam R S O est quantitas refractionis, & dimidium ipsius T R O vel R O S, tertia pars ipsius X R S. Vt verò sinus anguli X R S ad sinus anguli R S O, sic O S ad O R. Sed sinus Graduum tam paucorum proximè se habent ut arcus. Ergo sinus X R S est proximè triplus ad sinus R S O. Quare & O S tripla est ad O R vel O Q. Cum igitur O Q sit semidiameter, erit Q S diameter ferè.



XXXVI. PROPOSITIO.

Si Radij intra corpus densum non sunt paralleli, sed versus conuexum densi terminum conuergant, in breuiori distantia à con-

à convexo, quàm est diameter convexitatis, ad punctum confluent.

Convergant enim OQ & LN , versus QN . Et sit ipsius QO parallelus NZ , refractus in NS . Secant ergò se mutuo LN & ZN . Ergo refractus ipsius LN exterioris, quàm ZN , sit interior, quàm NS , refractus ipsius ZN per XI. Concurrit ergò cum QS , supra S , puta in M . Et QM est brevior, quàm diameter QS .

XXXVII. PROPOSITIO.

Si punctum radians propius fuerit convexo, diametro convexitatis; radij eius puncti refracti, intus in corpore denso non paralleli futuri sunt, sed diuergent.

Existente enim QS diametro convexitatis, sit M punctum radians propius lenti, quàm S , & radij MN , MQ diuergentes. Diuergent igitur etiam eorum refracti NL , QO , versus LO , ut prop. priori per XI, et si eorum est, eos paulo minus diuergere.

Haftenus solitariè de unicâ superficie conuexâ
lentis: iam de Lente totâ.

XXXIIX. PROPOSITIO.

Radij ex uno radiante puncto paralleli in lentem Crystallinam vel vitream utrinq; conuexam perpendiculari, ter obiectam incidentes, propius post lentem concurrunt ad unum punctum, quàm est diameter circuli, qui format auersam superficiem: & propius, quàm sesquidiameter obuersæ.

Sit lens DG , utrimq; conuexa, $ADGF$ perpendicularis per centra convexitatum. Veniant ergò à radiofo puncto longinquo paralleli quocumq; AD , CB . Cum ergò AD & CB & quicumq; alij sint in aëre quasi paralleli per XXIII: DG , BE in crystallo versus EG convergent per XXXIV, quasi concursuri in F . Ergo per XXXVI, punctum F ad quod

B 3 ipsius

IN angulo HIN , cui æqualis est OIP seu IPD , refractus igitur ipsius HI , intra convexitatem tertiã parte ipsius OIP declinabit ab OI versus IP , per IX . Atqui LIO æqualis est ipsi NIH , quia AI, IP æquales & HIO ipsi AP parallelus. Refractus igitur intra corpus densum veniens, incidet in aversam ejus superficiem KIG , (cujus perpendicularis per I est AL) angulo qui tertia parte maior est, quàm LIO . Habet igitur refractus ille intra corpus crystalli inclinationis in aversa superficie partes quatuor. Exiens verò per I in liberum aërem dimidio majorem debet in aëre sortiri inclinationem, quia qui ex illo aëre incidit in convexum inclinatus, perdit intra corpus tertiam partem inclinationis per $VIII$. Ergò inclinatus ille trans lentem in aëre habet sex partes, qualiù angulus NIH vel LIO habet partes tres. Duplus igitur est angulus illius inclinationis ad angulum LIO . Atqui LIP etiam duplus est ad LIO , quia LIO, OIP æquales. Ergo IP est ille ab HI veniens refractus, & bis quidem refractus, semel in ingressu I , convexi DIM , iterum in egressu I , convexi GIK . Quare P centrum convexi obversi BDI est locus concursus parallelorum CB, AD, HI : si convexitates fuerint æquales. Compara $XXXIV. XXXV. XXXIIX$. memoria causã sic. Tribus semidiametris post convexum obversum, duabus post aversum, unã post utrumq;.

XL. P O R I S M A.

Patet hinc si in æquales fuerint convexitates, punctum concursus fore post lentem in distantia, quæ inter utriusq; convexitatis semidiametros versetur. Major scilicet semidiametro minoris, quia altera superficies est de maiori circulo, quæ si de æquali fuisset, semidiametri mensura in hoc intervallo fuisset. Minor verò diametro minoris, quia superficies minoris non est sola. Minor deniq; semidiametro maioris, quia si superficies minoris circulus æqualis fuisset, tum deum semidiametri mensura maioris in hoc intervallo fuisset, nunc autem non æqualis, sed minor est.

Proposi-

XLI. PROPOSITIO.

Longinqui puncti de re visibili radij proximè lentem concurrunt, propinquieris puncti radiorum concursus post lentem est remotior.

Nam per XXXIV. XXXV. XXXIIV. in earum schematibus tribus, Puncto infinite distanti concursus est F. S. vel P. Vicissim puncto radiofo ad rem accedente, ut ex longinquo fiat propinquum, & collocato in F. S vel P, concursus excurrit in infinitum, per easdem & per III. Datis verò extremis dantur & intermedia, ut puncto versante ultra F. S vel P, concursus radiorum fiat intra infinitum, longinquus tamen sit, quantisper visibile valde propinquum, & vicissim visibili in longinquum exeunte concursus ipsis F S vel P propinquit: & deniq; per XXXV. Si utrimq; convexa sit lens, puncto radiofo, diametri intervallo absente à lente, concursus etiam diametro absit, radijs in lente parallelis existentibus.

Lentis Effecta per se.

XLII. DEFINITIO.

Cum quælibet lens convexa cogat radios unius lucentis puncti ad unum certum punctum; id verò longius post centrum abeat, si lucens propinquum est, quàm si longinquum, per XLI: quoties igitur concursus punctum nominatur simpliciter, nihil addito; intelligatur de eo puncto, ad quod coguntur & concurrunt radiationes puncti longinqui, scilicet parallelæ.

XLIII. PROBLEMA.

Super albo pariete pingere visibilia lente convexa.

In camera obscura lens convexa obsideat unicam fenestellam. Papyrus ad punctum concursus applicetur. Nam punctum rei visibilis super papyro, omnibus radijs, quibus in lentem radiat, rursus in unicum ferè punctum

punctum colligitur. Constant verò visibilia punctis infinitis. Infinita igitur talia puncta pingentur super papyro, id est tota rei visibilis superficies.

XLIV. PROPOSITIO.

Pictura lentis inversa est.

Nam lens est basis in quam insistent bini utrimq; conii, alterius vertex est in puncto visibili, alterius vertex in puncto picturae super papyro.

XLV. DEFINITIO.


Dicamus talem bigam doctrinæ causa Penicillum.

Iam verò penicilli omnes omnium punctorum in lente velut in communi basi conorum concurrunt & transit à lente rursus divergunt: sortiunturq; plagas contrarias. In hac pictura penicilli tres sunt *AB, CD, & EF* concurrentes in lente convexâ *GH*, veluti in basi communi.

XLVI. PROPOSITIO.

Sicut se habet Diameter picturæ ad eius distantiam à lente, sic se habet diameter rei visæ ad eius etiam distantiam à lente, ferè. Nam axes penicillorum (rectæ ductæ à puncto visibili ad punctum picturæ respondens) secant sese mutuò omnes penè

C in uno



in uno puncto, quod est proximè centrum lentis. Ergo anguli $\alpha\alpha\tau\delta$ $\alpha\sigma\sigma\upsilon\Phi\eta\nu$ æquales, per XV. primi Euclid. habent etiam bases cruribus utrimq; proportionales, per IV. sexti Euclid.

XLVII. PROBLEMA.

Semidiametrum convexitatis compendiosè indagare, si sit lens utrimq; convexa, æquali convexitate.

Papyrus applica, ubi res longinqua pinguntur distinctissimè omnium. Nam per XLIII. papyrus erit in puncto concursus. Ergo per XXXIX aberit semidiametro convexitatis, à lente.

XLIIIX. PROBLEMA.

Idem indagare, si lens sit hinc convexa, inde plana.

Convertite planum lentis versus visibile longinquum, idq; perpendiculariter; ut sic radij in ingressu rectangulo nihil frangantur. Et papyrus ibi applica, ubi pingitur visibile distinctè. Ergo per XLIII, papyrus erit in puncto concursus, & per XXV, diametro ferè integrè convexitatis aberit post lentem.

XLIX. PROBLEMA.

Lentem æqualis utrimq; convexitatis visibili propinquo metiri quantam habeat diametrum convexitas.

Tene lentem medio loco inter papyrus & visibile idq; perpendiculariter & præcisè: distantiam verò utriusq; à lente æqualibus incrementis auge vel minue, quoad pictura in papyro fiat distinctissima.

Nam quia visibile super papyro pingitur, papyrus igitur est in puncto concursus radiorum à puncto rei visibilis, per XLIII. Quia vero æqualiter absunt visibile & papyrus à lente; radiorum igitur partes intra corpus lentis erunt parallele. Si n. non essent parallele, nullius radij pars (præter intimi, per lentis umbilicum perpendiculariter ducti) in utramq; æqualium superficierum æquali inclinatione incurre-

incurreret, neq; igitur æqualiter refringeretur per XIIIX. Quare neq; æquali utrimq; intervallo à lente cum perpendiculari concurreret. Cum igitur sint paralleli intra corpus, concursus diametro lentis aberit, per XXXV.

L. PROBLEMA.

Lente utrimq; æqualiter convexa incendere.

Soli perpendiculariter obijce lentem, ustile applica in puncto concursus, quod aberit semidiametro convexitatis, per XXXVIII. quia radij centri Solis paralleli sunt, per XXIII.

LI. PROBLEMA.

Idem præstare per lentem altrobiq; planam.

Fit diametro ferè convexitatis post lentem per XXXV.

LII. PROBLEMA.


Lente convexa de nocte literas illustrare ad præsentiam unius claræ stellæ, ut legi possint.

Radiet stella perpendiculariter in lentem. Papyrus sit post lentem cum literis legendis. Si lens est utrimq; æqualiter convexa, distantia sit unius semidiametri, per XLIII. & XXXIX. Sin utrobi plana, diametri per XXXV. At si inæqualium convexitatum; distantia plus habebit semidiametro minoris, minus diametro. per XL.

LIII. PROBLEMA.

Lente convexâ lumen de nocte longissimè ejaculari.

Lumen sit post lentem in puncto concursus parallelorum radiorum. Igitur radij luminis divergentes versus lentem, refractione factâ paralleli exhibunt per XXXIV. XXXV. XXXIX. XL. Conducit lumen hoc poni in centro speculi con-



cavi, ut radij a versi reflectantur in lumen & per id transeant in lentem. Quòd si retraxeris tamen à lente; illuminatio illa fortissima ex infinito propius accedet ad lentem, ita poteris illam moderari, ut illumines aliquem locum quantum velis distantem per XLI.

LIV. PROBLEMA.

Distantiam rei visibilis lente utrimq; æqualiter convexâ metiri unicâ statione.

Nam si visibile pingitur in distantia papyri à lente, majori quàm est diameter convexitatis, visibile minus aberit, quàm diametro convexitatis. Quippe si papyrus aberit diametro, & visibile aberit diametro, per XXXV. Quare etiam si papyrus minus aberit diametro, visibile plus aberit diametro, per XLI. Deniq; si papyrus perfectam habens picturam, semidiametro convexitatis nota absit, res longinqua erit, ut mensurari amplius non possit picturâ, per XXXIX.

LV. PROBLEMA.

Idem lente convexâ præstare aliâ ratione: si nota sit quantitas rei visibilis.

Fit per XLVI. Nam ut longitudo picturæ ad ejus distantiam à lente, sic longitudo nota rei visibilis ad ejus distantiam à lente.

LVI. NOTA.

I. Baptista Porta pollicetur Problema in infinitum comburere per lineam ustoriam: quod ille de speculo tradit: alij vero de lente convexâ verum esse opinantur. Vtrum sequaris, impossibilia aggredieris. Repugnat Optica scientia.

Primò, combustio est propter sectionem radiorum. Sectio punctum est, non linea. Secundò: si in infinitum comburit, ergò & in ipsa superficie lentis, unde exit: quare lens destruetur. Tertiò, si radius acquirit vim comburendi, acquirit eam ex collectione multorum radiorum in unum.

in unum. At hoc impossibile est. Vnus enim radius in unum etiam punctum incidit. At unius puncti in qualibet superficie, una etiam sola est refractione cuiusq; radij per id punctum transeuntis. Vnus igitur etiam post id punctum radius, non multi distincti, distinctarum inclinationum, qui in unum refractione colligantur. Sed de hac re infra plura, ubi concava convexis associavero.

Haftenus de lente convexa, eiusq; usibus citra respectum oculi, iam de ijs usibus, quos habet in adjuvandâ visione. Et prius De Ipsa Visione.

L VII. AXIOMA PHYSICVM.

Axes per centra pupillæ & humorum oculorum transeuntes naturali motu vel potius quiete paralleli sunt, voluntariè verò contorquentur ad propinqua contemplanda.

L IIX. DEFINITIO.

Distincta visio, est in quâ partes rei subtilissimæ elucent, & in conspectum veniunt. Confusa; in qua partibus majoribus apparentibus, minores latent, & veluti oblitterantur seu obliuuntur, confusis inter se terminis. Fortis visio seu clara, est cū res videtur quasi in multo lumine; Debilis seu obscura, cum res videtur quasi in tenui lumine, quale est in Eclipsi Solis, aut lucente Lunâ.

L IX. PROPOSITIO.

Superficies densi, quæ parallelas per corpus venientes post corpus refractione factâ perfectè concurrere facit, est Hyperbolicæ adfinis.

Esto circuli pars ABCDEFG, centro H. & perpendicularis HD producta sit sufficienter. Eiusq; paralleli RA, PB, LC, KE, MF, QG.

C


3

Quod

Quod si refractiones omnes essent incidentiæ proportionales, refractione factâ paralleli omnes in idem punctum concurrerent, puta in I, per XXXV. Sed quia non sunt proportionales per XII. Sed augentur supra modulum in magnis inclinationibus, ideoq; LC quidem & KE concurrunt in I, at proximi PB & MF concurrunt altius in N, & ulteriores RA. QG adhuc altius in O.

Vt igitur puncta ONI cœant in N oportet in AG fieri minores refractiones, in CE majores. Minor autem erit in AG, refractione, si minor sit illic inclinatio RA, QG ad superficiem, major in CE, si major inclinatio LC, KE.

Minor autem inclinatio fit RA ad AB, si AB termino B ipsi R appropinquet, hoc est, si superficies aliqua sit, quæ circulem superficiem ABC in A secet, altior incedens quàm ABC. Eadem si BCD in E rursus secuerit, major erit ipsius LC super eam inclinatio. Sic & in E, G. Secat igitur nova linea veterem in punctis quatuor. Idem autem facit Hyperbola. Non facit Ellipsis. Nam Ellipsis portionem semicirculo minorem non secat, nisi in duobus punctis. Parabola verò etsi idem facit, non est tamen similis quæsitæ superfici ei ob hanc causam. Nullum enim ad certum angulum sese accommodat. At superficies quæsitæ sese ad angulum certum debet accommodare, qui est 96° , quia refractione maxima est 48° , cujus duplum est 96° . per IX.



LX. PROPOSITIO.

Crystallinus humor oculi est lens convexa, formâ hyperbolæ, & retiformis tunica, spiritus plena, post Crystallinum, est pa-

est papyri vice, & pinguntur in ea visibilia pictura reali. Esse Crystallinum humorem, lentem convexam pellucidissimam, constat experientia Anatomicorum. Figuram etiam posteriore parte esse hyperbolicam; & Retiformem in circulum seu orbem cavum explicari undique circa Crystallinum, in distantia certâ à Crystallino; & præterea albam subrufam esse, ut papyrum, testantur ijdem.

Hisce positis per XLIII. sequitur picturam existere visibilium rerum in retiformi, & per LIX, quia est figurâ hyperbolæ cognatâ, consentaneum est, id fieri ad conciliandum penicillis perfectum & purum acumen, ijsq; picturam fieri distinctissimam.

LXI. PROPOSITIO.

Visio est sensio affectæ retiformis spiritu visivo plenæ: sive, Videre, est sentire affectam retiformem, quatenus affecta.

Retiformis tunica pingitur à radijs coloratis rerum visibilium. Hæc pictura seu illustratio, est passio aliqua, non tantum superficialis, ut eum parieti creta affricatur, aut lumen in eum allabatur, sed etiam qualitativa penetrans in spiritus. Probo primùm à natura lucis, quæ si fortis & condensata, urit; per L. Quod si fuerit eadem proportio subtilissima lucule in retiformem allapsæ ad spiritus in retiformi subtilissimam tenuitatem, quæ est foris in aëre densissima lucis ustorie ad crassam corpulentiam eorum, quæ uruntur: tunc non minus in retiformi sequetur actio lucule penetrans, & passio retiformis spiritusq; quàm foris sequitur ustio, (actio) lucis, & destructio, (passio) materie, quæ uritur. Probo secundo ab experientia. Oculi intenti in lucem fortem adeo afficiuntur, ut etiam subtracti à splendore viso, tamen imaginem ejus, retineant & circumferant, satis interdum diu. Pictura igitur illa retiformis, est passio penetrans. At hæc pictura nondum absolvit visionem integram; nisi species retiformis sic patientis, continuatione spirituum transeat in cerebrum, ibiq; sistatur ad facultatis animæ limina: quod sic fit.

Quem-

Quemadmodum omnis sensus externus perficitur receptione & impressione, passione scilicet; cum imprimitur ei quod sentit, species rei externa: & hæc passio sensio dicitur. Sic etiam intus in cerebro est aliquid, quicquid sit, quod communis sensus dicitur, cui imprimitur species instrumenti visorij affecti, hoc est picti à luce rei visibilis. Quæ igitur accidunt Instrumento extra sedem sensus communis, ea per speciem immateriatam delapsam ab instrumento affecto seu picto, & tractam ad limina sensus communis illi sensui communi imprimuntur. Sed impressio hæc est occulta rationis: nec tutò dici potest, speciem hanc intrò ferri per meatus nervorum Opticorum, sese decussantium. Nam usus horum nervorum patet alius manifestior, ut scilicet spiritum visum ex utraq; cerebri parte utriq; oculo sufficient, qui idè decussati sunt, ne altero sinu cerebri laeso, aut obstructo nervo, qui ex eo exit, statim & alter oculus privaretur spiritu. Cū igitur manifestū usum habeant nervi Optici; obscurum est, an etiam insuper serviant speciei affecti Instrumenti traducenda intrò in cerebrum: an potius sint alij alij spiritus, subtiliores corporeo isto, per retiformem sparso, qui meatu corporeo non indigentes, per totum corpus liberè spaciuntur, membrorumq; affectiones excipientes, cerebri facultati, quæ communis sensus dicitur, communicent. Fortè sic est, ut transferatur hæc species affecti instrumenti à retiformi in cerebrum per meatum quidem nervi Optici, non tamen quatenus is est aliquis corporeus meatus, sed quatenus is ab ipsa sede sensus communis usq; in nervum opticum est spiritu plenus, & sic continuatio spiritus sit causa transeuntis affectionis ab oculo in cerebrum: sicut in stagnantibus undis motus lapillo injecto factus, ad littora usq; propagatur: quousq; scilicet superficies aquæ stagnantis continuatur.

Potest dici quemadmodum Sol lineis rectis pellucidis illuminat omnia; sic Anima facultatem, quæ est in cerebro, lineis spiritalibus quocunq; flexu, tantummodo continuis, illuminare instrumenta. Tunc enim sicut nihil nos juvat aër pellucidus, si opacum intercurrit Solem & nos:

& nos: sic etiam nihil profuerit spiritus, qui astat retiformi, si superius & interius in capite quacunq; de causa spiritus ille ductus interceptiatur, continuusq; esse desinat. Hinc illa subita luminis extinctio in morbis, non per recursum spirituum, sed per abruptionem interceptionemq; eorum, à constricto, vel obstructo vel præciso meatu.

Hæc de alterâ passione, quæ est sensus communis, & causatur à specie patientis instrumenti: quod ejus objectum est.

LXII. PROPOSITIO.

Instrumento utroq; similiter affecto, videmur speciem unam videre: at dissimiliter affectis vel pictis intus duorum oculorum tunicis retiformibus, duo nobis pro uno repræsentantur visibilia.

Non est enim sensus instrumenti in sensu communi, quatenus nudum instrumentum. Aut si est, perpetuus est, nihilq; aptus ad novam aliquam efficiendam sensationem. Sed est sensus instrumenti, quatenus id affectum per LXI.

Si ergo similiter affecta, similis etiam ab utroq; affecto impressio seu passio erit, in sensu communi, uno & eodem existente. Vestigium enim ut sic dicam, quod dexter oculus sua affectione imprimit sensui communi, imprimit & sinister suâ: quantum ad efficiendam in cerebro novam sensationem attinet. Posterior pars Propositionis sequitur ex LXI. Nam si visio est sensio instrumenti affecti, ut affectum: duo verò instrumenta sunt, quodlibet affectum peculiariter, duæ igitur fient impressiones in sensum communem, & sic duæ ejusdem rei sensationes.

Non servit igitur decussatio nervorum Opticorum intus in cerebro, ad agnoscendam rei duobus oculis visæ unitatem. Repugnat enim & hoc, quod semper ij decussati sunt: at non semper videmur rem unam videre, etsi unam utroq; oculo videmus.

LXIII. PROPOSITIO.

D

Non

Non est possibile, ut retiformis, retinens eundem situm in oculo tam à propinquis, quàm à remotis distinctè pingatur.

Nam per XL I. remoti puncti radiationes concurrunt propius post lentem, quàm propinqui. Iam verò per XLIII. in puncto coitionis fit accurata pictura, ergo extra punctum concursus fit confusa pictura, quare per LX etiam visio indistincta. Et sic, ubi accuratè pinguntur propinqua ibi non est concursus radiorum puncti remoti, ibidem igitur remota pinguntur confuse, & vicissim: & per consequens, quo situ retiformis tunica ad crystallinum remota videmus distinctè, illo situ ejusdem, propinqua videmus confuse.

LXIV. PROPOSITIO.

Sunt qui remota distinctè vident, propinqua confuse, quos Aristoteles appellat $\pi\epsilon\sigma\sigma\acute{\upsilon}\tau\alpha\varsigma$: sunt qui propinqua distinctè, remota confuse, qui Aristoteli sunt $\mu\acute{\upsilon}\omega\pi\epsilon\varsigma$: sunt, qui propinqua & remota confuse, deniq; qui utraq; distinctè.

Propositio est physiologica & ferè medica. Qui utraq; simul confuse vident, oculi morbum habent, lusciosi vel planè caci. Conformatione enim oculi vitiata, sequitur hoc $\pi\acute{\alpha}\delta\textcircled{C}$.

Qui utraq; simul distinctè vident, oculum & sanum habent, & figurâ mobilem. Nam quia per LXIII. retiformis nequit eodem situ ab utrisq; equaliter pingi, in his verò qui utraq; distinctè vident, equaliter pingitur per LX. LXI. retiformis igitur respectu humoris crystallini, aut humor crystallinus respectu retiformis tunica loco movetur ijs. Atq; hoc est verisimile oculum sanum, vegetum & juvenilem, sicut manifestum habet motum naturalem anteriùs in pupilla, constrictionis in magnâ luce, & dilatationis in tenui: sic etiam in retiformi tunica post crystallinum habere facultatem eandem, ut ventrem dilatet, quo fundus ad Crystallinum attrahatur, si remota sunt videnda: vicissim constringat ventrem, ut fundus discedat, si inspicienda propinqua. Aut insit motus iste naturalis potius tela aranea, seu arachnoidi

noidi tunica, quæ lentem humoris crystallini in centro sui affixum habet, eumq; per radios nigros circumcirca emissos cum uvea connectit. Nam radij isti nigri, processus ciliares dicti, videntur ideo sic pectinatim esse distincti, ut quilibet pro se esset veluti peculiaris quidam musculus; quibus universis simul recurrentibus in sese & sic brevibus effectis, hoc veluti diaphragma oculi angustius redditum, contractis lateribus oculi, facit oculi figuram non nihil oblongam seu Ellipoiden, ubi fundus seu retiformis tunicae cavitas recedit ab humore crystallino. Attenuatis vero ciliaribus processibus in tela aranea, & sic in longum exprorectis, ampliatur circulus per latera oculi ductus, & fit oculus magis lenticularis figura, fundo retiformis ad Crystallinum accedente; ejusdem uveæ ministerio, quæ pupillam etiam arctat & laxat. Hunc ad usum humores, excepto Crystallino fluxiles sunt, & comprimi possunt.

Qui verò alterutra solum distinctè vident, oculum habent sanum quidem, sed jam indurescentem, adsvectum & quasi senilem. Vanum enim est, senes solos propinqua non videre distincta, aut solos juvenes remota. Promiscuè hæc utrisq; eveniunt, secundum habitus corporum, aut exercitia juventutis. Nam qui à pueris venationibus, aucupio, navigationibus, itineribus est deditus, oculum adsvectum ad remota; sed quia identidem cibum capere, cum hominibus colloqui oportet, manet oculus in exercitatione etiam ad propinqua respiciendi. Tempore tamen debilitatur exercitatio; ita fit ut ferè ij, qui nullo in juventute vitio visionis laborant, in senio sola remota distinctè videant. Magis enim naturale est, oculos parallelas tenere, quàm contorquere ad propinqua per LVII. In senio verò fatigatur oculus, ut retentâ naturali directione, omittat ea, in qua cum labore perspicitur. Atq; hoc illis vitium plerunq; tardè obvenit, in multo senio.

Contra, vitam à pueris agentes sedentariam, intra parietes, literis incumbentes & manuarijs artificijs subtilibus, ij celeriter assvescunt ad propinqua, nec unquam successu ætatis abstrahuntur, sed potius magis magisq; cæcutiunt ad longinqua.

Sunt etiam primi generis homines magis ebriosi & somnolenti & ociosi, & cogitabundi, hoc est, qui crebrò dimittunt curam rerum ante pedes & sub manibus versantium, quibus ideò oculi diriguntur ut plurimum in situm parallelū, quo situ non nisi remota distinctè videntur.

Secundi verò generis homines sunt potius sobrij, vigiles, laboriosi, intenti ad præsentia.

Sic illi ferè procerâ statura sunt, quia magis à fundo remotum habent oculum & longiùs prospiciunt, hi potius pumili; quod tamen non est perpetuum. Dicitur est enim hic etiam aliquid sibi vindicare corporis habitum naturalem.

LXV. PROPOSITIO.

Convergentibus quacunq; ratione unius radiosi puncti radijs versus oculum impossibile est fieri distinctam visionem.

Omnis enim oculus factus est ut aut remota distinctè videat aut propinqua. Remota radiant quasi ω ρ α δ η λ ω per XXIII. Propinqua divergentes mittunt radios in oculum per XXIV. Nullum ergo distinctè visibile punctum radiat sic, ut ejus radij ubi oculum tangunt convergant.

Haftenus de oculo & visione: sequitur de usibus lentis respectu oculi.

LXVI. AXIOMA OPTICVM.

Res cognitæ distantiae & incognitæ magnitudinis sub magno visionis angulo ex inopinato comprehensa videtur magna, sub parvo parva.

Probatur in Optic. ex XIX.

LXVII. AXIOMA OPTICVM.

Intervalla inter oculum & rem minutam, sunt in eversa proportione angulorum visiorum: hoc est, quo longiùs res quælibet recedit, hoc minori angulo cernitur.

Res.

LXVIII.

Res cognitæ magnitudinis, & incognitæ distantia, ut facies hominis adulti, unico oculo sub magno visionis angulo ex inopinato comprehensa, videtur propinqua, sub paruo remota per LXVII.

Est conversa demonstratio prioris. Unico vero oculo visionem oportet esse peractam; quia dualitas & distantia oculorum (nec minus & motus capitis, vicem supplens plurium distantium inter se oculorum) distantiam rei, si proportionata est, ex incognita reddit cognitam.

LXIX.

Cum igitur remota omnia, putentur eodem abesse intervallo, quippe incognito quod tamen ob hoc ipsum, quia valde remotum, quasi cognitum concipitur (verbi causa unam cœli concipimus superficiem, in qua insint omnes stellæ, quocunque intervalli discrimine) remota igitur incognitæ magnitudinis sub majori angulo visa, majora putantur, sub minori minora, absolutè. Ex LXVI.

Vt si quâ ratione angulus quo Luna videtur ampliatur; lunam ipsam putabimus majorem esse effectam; quia de distantia lune nihil aliud concipimus, quam hoc; illam quocunque videatur angulo, in eodem cœlo manere.

LXX. PROPOSITIO.

Per lentes convexas, oculo posito intra propinquitatem puncti concursus radiorum ab uno visibilis puncto fluentium, Visibile repræsentatur in suo situ, v. g. erectum, si ipsum est erectum: & cætera.

Sit lens AB. Visibile CE, non jam unicum punctum, sed quantitas. Puncta visibilis extrema C & E. Radiatio puncti C sit CBF, CHF, CAF & c., punctum concursus F. Sic radiatio puncti E, sit EBD,


D 3 EKD,

$EKD, EAD, \&c.$ punctum concursus D . Sit jam oculus intra puncta concursus DF & lentem AB , loco aliquo intermedio, ut in IG & quantitas pupilla foraminis IG . Ergo sic positus oculus, non admittit totum penicillum $EADBE$, puncti E , sed solam partem $EKIDGBE$. cujus junctura in parte lentis KB . Rursum IG non admittit totum penicillum $CAFB$ puncti C , sed solam partem $CAIFGHC$, cujus junctura in parte lentis AH . Quilibet igitur radiorum inter KI, BG monstrat punctum E , dexter dextrum. Et quilibet radiorum inter AI, HG monstrat punctum C , sinister sinistram. Quare quo situ $AHGI$ & $KBGI$ penicillorum partes ad oculum GI allabuntur, eodem situ etiam C & E vertex penicillorum seu puncta visibilia revera siti sunt.

LXXI. PROPOSITIO.

Omnis per convexas lentes erecta representatio erectorum visibilium longinquo- rum, est necessariò confusa: & tanto confusior, quanto lens convexa ab oculo remotior.

Nam per superiores à XXXIV. in XL. uniuscujusq; puncti de re visa longinqua (sit in priori schemate puncti C) radij CA, CH & reliqui paralleli (per XXI) usq; ad lentem convexam; post refractione facta in lente convexa jam versus oculum IG convergunt. At per LXV. convergentibus radijs unius puncti ad oculum, impossibile est distinctam fieri visionem. Cumq; convergentia sit causa confusionis, major convergentia erit majoris confusionis causa. Major autem est convergentia in



via in majori parte penicilli ab oculo intercepta, cum scilicet oculus est à lente remotior. Major igitur & confusio erit erecta visionis, si lens ab oculo remotior fuerit.

LXXII. PROPOSITIO.

Aliqua per convexas lentes erecta repræsentatio visibilium propinquorum, est τοῖς πρῆσβύτις distincta.

Presbyta dicuntur Aristoteli, qui, cum remota distinctè videant, ad propinqua sunt lusciosi, ut LXIV. Talis igitur aliquis per XXIII. oculos affvescit ad radios uniuscujusq; puncti parallelus. Iam verò per XXXV. & XXXIX. est aliquod punctum trans lentem seu perspicillum, in quo si punctum rei visibilis ponatur, radij illius puncti transit à lente paralleli incedunt versus oculum. Distincta igitur repræsentatur illis res visibilis per lentem convexam.

Et nota, Demonstratio definit limites rerum subtiliter. Natura verò cis & ultra evagatur nullo magno visionis incommodo, nisi cum nimio evagatur.

LXXIII. PROPOSITIO.

Oculus in puncto concursus parallelorum collocatus, videt propinqua adhuc erecta.

Nam oculus collocatus in puncto concursus parallelorum (hoc est venientium à puncto remoto & longinquo per XXIII) est adhuc intra terminos concursus radiorum puncti visibilis propinqui per XLI. Quare per LXX. visibile adhuc erectum repræsentabitur.

LXXIV. PROPOSITIO.

Oculus in puncto concursus radiorum à puncto rei defluentium constitutus, punctum illud radians per lentem distinctè non videt, sed omnium confusissimè.

Nam

in *D* concurrentes, indeq₂ rursus divergentes, versus *P O* latitudinem oculi;) his inquam radijs à sinistra lentis parte *A* venientibus, *E* dextrum punctum irradiat oculum *O P*. Contra sinistrum punctum *C* radiat in *O P* oculum radio *C B F O*, & vicinis versus *K* qui convergentes in *F* post iterum divergunt per *XXI* versus *O P* oculum; & ita *C* sinistrum punctum visibilis radiat à *B K* dextra parte lentis. Cum autem oculus non capiat, quid radijs in lente ipsa accidat, sed aestimet, ibi sitam esse quamlibet partem rei visibilis, unde ejus radij oculum ingrediuntur per *XIX*, ideoq₂ res visibilis *C E* representatur eversa oculo in *O P*.

LXXVI. PROPOSITIO.

Punctum eversionis, seu in quo se secant binæ lineæ à binis punctis rei visibilis in centrum oculi confluentes: id inquam punctum est inter visibile & lentem.

Probabitur enim, ut prius proposit. LXXV. lentis partes dextras respondere sinistris rei visibilis, & vicissim. Nulla ergo fit sectio conorum visivorum inter oculum & lentem, sed inter lentem & visibile. Quod verò de conis totis verum est, idem & de lineis medijs conorum verum esse necesse est, quæ in centrum pupillæ incidunt; atq₂ etiam de ijs quæ in extremitates pupillæ. Vt in schemate p. LXXV. in puncto *S* secant se *E A D L P* & *C B F L O*, in *P. O.* extrema pupillæ lapsi. *L.* verò sectio est pars concursus conorum *O D P*, *O F P* in *O P*, qui hic jam non consideratur, quia hic supra prop. LXX, situm rei non evertibat. Erant tunc cono *I A C H G* & *I K E B G*.

LXXVII. PROPOSITIO.

Oculus πρεσβύτου nihil penè everfarum rerum per lentem convexam distinctè videt.

Cum enim πρεσβύτης per LXXIV. oculum assuescerit ad radiationem parallelam, puncti scilicet remoti: eoq₂ non sit aptus ut radijs unius

E puncti

puncti sensibiliter divergentibus videat distinctè : In eversione visibilis, omnia visibilis puncta post $D. F$ concursum radios habent iterum divergentes versus oculum $O P$. per XXI. Ut DO, DP , sic FO, FP . Non videt igitur oculus Presbyta in $O P$ distinctè, nisi si $O P$ latitudo pupilla ad DO longitudinem non habeat amplius sensibilem & proportionatam distantiam, ut sic DO, DP sint quasi paralleli.

LXXVIII. PROPOSITIO.

Oculus $\mu\acute{o}\omega\pi$ quamlibet rem seu propinquam, seu remotam, ubi lente convexa fuerit eversa, videt distinctè in certâ remotione oculi à concursu radiorum unius puncti de re illa visibili.

$\mu\acute{o}\omega\pi$ es sunt Aristoteli, qui propinqua distinctè vident, ad remota lusciosi. Ut p. LXIV.

Eorum igitur oculi sunt affecti ad radios sensibiliter ab uno puncto divergentes. At per LXXV eversio contingit extra punctum concursus. Per XXI. verò unius lucentes puncti C radij, qui divergebant versus lentem KB , & transit à lente convergebant versus punctum F concursus, eo jam etiam transmissi rursus divergunt versus $O P$ oculum. Apti igitur sunt huic oculo ad distinctam visionem illius puncti C .


Dico autem in uno certo loco à $D F$ concursibus radiationum visibilis DE spectandi. Nam facultates oculorum diversorum distinguuntur secundum divergentias majores & minores per LXIV. In majori vero remotione pupilla $O P$ à concursibus $D. F$, est minor divergentia, quia minor erit ODP vel OFP angulus, si basis OP eadem, crura verò OD, PD longiora. Cuilibet igitur oculo sua servit certa remotio à $D. F$. concursibus.

LXXIX. PROPOSITIO.

Vnica superficies convexa parvo circulo, in cogendis radijs ad punctum æquipollet duabus lentis superficiebus convexis.

vexis ex uno circulo duplo majore desumptis.

Sit convexum utrimq; equaliter AB circulis AD B, AC B, quorum centra F, E. Ergo per XXXIX punctum concursus est F. Dimidia ipsius DF vel CE sumatur quæ sit GL. Et centro G, spacio GL circulus scribatur HLI. qui solus refractionem causetur parallelorum ex plaga G centri venientium. Sit GL in K continuata, & LK dupla ipsius GL, ideoq; equalis ipsi DF. Ergo per XXXV. paralleli in HLI refracti concurrent in K. Idem igitur præstat convexitas HLI unica parvi circuli, quod in AB, duæ, circuli duplo majoris; quia punctum concursus utrimq; æqualiter remotum est à corpore denso, quippe DF & LK æquales.




XXC. PROPOSITIO.

Omnia per convexam lentem erecta imago visibilis rei, est necessario major justo.

Nam per LXX. conversam, si imago est erecta, oculus est intra propinquitatem puncti concursus radiorum, ab uno visibilis puncti concursus radiorum, ab uno visibilis puncto fluentium, Et conorum à visibilibus punctis in pupillam, seu linearum ab iisdem in centrum oculi ingredientium interseccio nulla fit inter visibile & oculum per LXXVI. Sit ergo lens AB, oculus C, visibile DE. Cum ergo plura proponantur puncta rei visibilis, linearum singularum ab ijs singulis descendendum in centrum oculi, vel vicissim, aut una sola erit perpendicularis in lentem, aut nulla. Quare aut omnes refringentur in lente, aut præter unam omnes, per X.

Iam per LXXIX, dua lentis convexitates, idem præstant in refractione, quod una, quæ cõtinet in se utramq̃. Ne igitur nos hic turbet duplicitas convexitatis, sit unum convexum aequipollens utriq̃, AHB . Et connexus punctis D, E . cum C per rectas, secantes convexum densum in I, K , per dicta patet, quod hæ non sint futura visiva punctorum D, E , quippe rectæ manent: cum leges optica velint ut CI in superficie I deflectat ab ID , & accedat ad eam, quæ est superficiæ perpendicularis in I . puncto, quo pacto cadit introrsum intra D versus E : similiter CK refractione facta non cum KE continuabitur, sed cadet à KE introrsum versus D . Atq̃ sic lineæ CI, CK & angulus ICK , quo visibile DE potuisset videri citra lentem, jam interposita lente non apprehendunt visibile DE , sed aliquid minus, quod æstimabitur habere magnitudinem ipsius DE totius.



Vt igitur totum DE apprehendatur; oportet venire ab oculo exteriores, quàm CI, CK , puta CA, CB . Hæ igitur si justo spacio distiterint, à CI, CK refractione in A, B factâ apprehendent D, E . ut sint visivæ CAD, CBE . Cum autem ACB angulus sit major quàm ICK , quo spectatur visibile remotâ lente: majus igitur putabitur visibile DE , quàm est per LXVIII. Nam XIX nescit oculus quid radijs CA, CB accidat in transitu A, B , putatq̃ illos continuari in rectum, ac si essent CAF, CBG , ubi FG imaginata quantitas est major quàm DE .

XXCI.

Oculus quo fuerit remotior à convexâ lente versus punctum concursus, hoc videt angustiorem hemisphærij partem, per lentem, eamq̃ partem hoc minorem æstimat.

Cum.

Cum enim & lens & quæ per eam utring, cernuntur; eodem angulo, & eo quidem minori cernantur, lente remotâ, quam propinquâ; sequitur ut pars visa lente remotâ minor putetur per LXVII. Sed & revera minor pars per eam cernitur remotiorem. Sit enim in priori schemate lens AB , remotior ab oculo C , quàm ab oculo O , & ductis ex O rectis in A , B . quoniam OA , OB interiores sunt quam CA , CB , refracti ipsorum, sectione facta in A & B erunt exteriores per XI. Sit ipsius O A refractus AM exterior, & ipsius O B sit refractus exterior BN . Patet igitur quod Refractis AM , BN venientibus à propinquo oculo O major hemisphærij portio abscindatur; refractis verò AD , BE venientibus à C oculo remotiori, abscindatur, portio hemisphærij minor. Id multò evidentius erit, si sic manentibus inclinationibus refractorum, oculi O C in unum coëant, & lens diversos acquirat situs.

XXCII. PROPOSITIO.


Oculus visibilem rem longinquam conspicatus, propè lentem, ubi recesserit eminus, versus concursus punctum; eandem videbit majorem, quàm propè.

Videtur contraria priori, ideò ei apponitur declarationis causa. Attende enim, quod res omnes lente remotâ visa, minori angulo cernantur junctim per LXXXI. At res singula seorsim, quæ videntur lente & propinquâ & remotâ, remotâ lente videntur majori angulo. Nam angulus quo lens spectatur tota, & angulus, quo per lentis particulam spectatur res aliqua, contraria patiuntur. Dum enim lens removetur, ille minuitur, hic augetur, & cum eo portio lentis, qua res illa spectatur, augetur; primum ut visibile idem apprehendat, deinde ut idem majus repræsentet; adeò, ut oculo in ipsum punctum concursus incidente, unicum visibilis rei punctum tota lente cernatur: quod propè oculum cernebatur per lentis particulam aut minorem aut cerè non majorem, quàm est oculi pupilla.

Nunc ad demonstrationem. Sit ergo, ut supra per LXXIX potestas lentis utrimq; convexa collata in superficiem AB corporis denfi porrecti usq; ad visibile. Sit ea superficies obversa oculo. Et collocetur oculus in F propinquo puncto, & in C. remotiori. Sint autem in superficie AB, puncta D E, ad qua ex Foculo propinquo ducantur linea FD, FE, comprehendentes angulum DFE, quo angulo & quibus lineis comprehendatur visibile. Dico oculum C remotiorem, majore angulo indigere ad idem visibile, si fuerit longinquum, comprehendendum.

Educantur enim ex D, E, refracti usq; ad visibile DG, EH. Quod si ex C non majore angulo videbitur illud visibile longinquum, videatur igitur aequali, & ipsis FD, FE ex C parallela in superficiem ducantur CA, CB ut ACB & DFE sint aequales. Cum igitur CA, CB magis inclinentur super superficiem AB, quam FD, FE; magis igitur refringentur CA, CB, quam FD, FE, per X. Quare refracti ipsorum CA, CB (& propter hoc & per XXXIV.) concurrent cum refractis ipsorum FD, FE, alternis: quia CA, FD paralleli, ut & CB, FE. Concurrant, & sint puncta concursuum G, H. Et ipsorum CA, CB refracti sint AG, BH. Cum igitur positum sit, visibile videri angulo ACB, videbitur & comprehendetur refractis AG, BH. Videtur verò, & comprehenditur etiam refractis DG, EH.

Ergo




Ergo visibilis termini necessariò erunt G. H. Et sic visibile non longinquum erit, sed propinquum; quod est contra assumpta. Non videbit igitur oculus in C, visibile hoc, radijs CA, CB, & angulo ACB, equali ipsi DFE, sed lineis exterioribus, puta CI, CK, & angulo ICK, majori quàm ACB vel DFE: ut ipsorum CI, CK refracti IL, KM propemodum paralleli ipsis DG, EH excurrere possint, ad comprehensionem punctorum extremorum visibilis longinqui.

XXCIII. PROPOSITIO.

Oculus eandem rem visibilem longinquam conspicatus per duas lentes convexas, singulas seorsim: siquidem utriusq; distantia ab oculo fuerit in eadem proportione ad suæ convexitatis diametrum; res visibilis per utramq; lentem seorsim videbitur eadem magnitudine: sin variata erit proportio; majorem videbit rem per lentem illam, cuius distantia in proportione fuerit major.

Sit oculus O, P Q lens magna, centro R descripta. Connectantur puncta P Q cù O, & in punctis harum linearum sit minor lens ST, quæ eductis per S. T. puncta parallelis ipsis PR, QR, quæ sint SV, TV ex puncto eorum concursus V describatur. Et refringatur OP, OQ, in PVV, QX.

Cum igitur VS & RP sint parallela, sic & VT, RQ: incidentes in eas rectæ OS, OQ facient æquales angulos OPR, & OSV, sic OQR & OTV. Sed & VTS & RQP sunt æquales, quippe inter lentes, & earum semidiametros: quare & OTS & OQP, quippe ablatiis æqualibus, erunt æquales. Aequaliter igitur OT super TS & OQ super



super PQ lente inclinatur. Quare & refractiones utrimq; erunt aequales. Refracti igitur ex S, T . paralleli erunt ipsis PV, QX . sint ST, TZ . Et cum sint parallela, eandem igitur ad sensum comprehendent rem visibilem per $XXIII$. & sub eodem angulo POQ vel $SO T$: quare eadem magnitudine censebitur, per $LXVI$. Est autem etiam, ut VS semidiameter lentis ST , ad SO distantiam ejus ab oculo, sic PR semidiameter lentis PQ ad PO distantiam ejus ab oculo, & permutatim. Patet igitur prior pars propositionis. Iam de alterâ.

Dico jam si alia sit proportio distantiarum, alia semidiametrorum ut si à lente ST , distet oculus O , intervallo SO , à lente verò PQ , oculus V intervallo PV , tunc majora videri visibilia lente PQ , cujus ab oculo V distantia major est in proportione PR semidiametri, quàm est lentis ST distantia SO ab oculo O in proportione SV semidiametri: quippe cum OS ad SV sit ut OP ad PR , OP verò sit brevior, quàm VP .

Nam $XXCII$. lente PQ posita, majora videntur visibilia oculo V , quàm oculo O . At per hæcenus demonstrata oculo O aequalia videntur visibilia per ST , & per PQ lentes in hoc situ. Ergo majora videntur visibilia oculo V lente PQ , quàm oculo O , lente ST .

XXCIV. PROPOSITIO.

Oculus, quo longius extra punctum concursus abierit, hoc eversa videt minora.

Hujus Propositionis demonstratio declaratione potius comprehenditur, & comparatione precedentium.

Nam incipiamus à $XXXVII$. conversa, & sit pro puncto radiante oculus, perinde enim est per III . Oculus igitur, si sit tam propinquus lenti, tunc ejus radij per lentem transeuntes, divergunt, etiam refracti versus visibile, & fit quod demonstratum est prop. LXX . ut visibile appareat erectum. Oculo verò à lente recedente paulò longius, augentur visibilia per $XXCII$. quamvis minuitur earum numerus per $XXCI$. Exinde oculo veniente propè punctum concursus, ejus radij lentem ingressi,

ingressi, fiunt paralleli per XXXV. conversam. Si latum unguem amplius removeris oculum à lente, omnes oculi radij per lentem refracti incipiunt concurrere, primum post visibile. si continuarentur, inde in ipso unico rei visibilis longinqua puncto. Et tunc de illo visibili nihil nisi punctum unum cernitur, & id tam magnum, quanta lens apparet, & confusissimè. Si paulò amplius oculum à lente abstraxeris; concursus ille radiorum seu linearum ex oculo (refractorũ in lente) jam deserit rem illam visibilem, & accedit versus lentem. Sed quia concurrentes radij se mutuò secant, & pergunt ultra concursum per XXI ideo & hæc linea ex oculo per lentem ducta ultra hanc suam sectionem, inverso ordine in visibile incidunt per LXXVI. & primò minimam ejus particulam, punctoq; proximam apprehendunt; tunc igitur incipit fieri, quod est demonstratum Prop. LXXV, ut visibile appareat eversum aliquã sui particulã.

Inde oculo magis ac magis elongato, illa sectio magis magisq; versus lentem descendit per XLI. & angulus sectionis fit major, plura de visibilibus comprehendens, usq; dum oculus elongetur longissimo intervallo, tunc linea ex ejus centro veniunt ad lentem penè parallela, & fit, ut propos. XXXIV. ut coeant in certo & dimenso puncto trans lentem. Quantum igitur est in schemate prop. XXXIV. angulus BFD, tanta portio de hemisphærio videtur situ everso. Nam BF, DF progressi ulterius se rursus secant, & sic incidunt in visibilia.

Semper autem excipiuntur ab hac inversione visibilia illa, quæ sunt propiora, quàm ista sectio linearum ex centro oculi ultra lentem. Unde fieri potest, ut eodem anguli situ remota aliqua videantur inversa, alia propinqua erecta.

Hiscæ sic constitutis, primũ lens (per LXVII.) quo remotior ab oculo, hoc minori cernitur angulo, & cum ea totum etiam, quod per eam inverso situ videtur. Deinde cum digressionem lentis ab oculo plura etiam de Hemisphærio visibili, in eam recipiuntur, ut jam est explicatum. Plura igitur videntur junctim minora, in remotiori situ oculi, quàm

*pauciora in situ propinquiori. Quare duobus nominibus etiam singula
eversorum sunt minora, si lens ab oculo remotior.*

XXXV. PROBLEMA.

*Vnâ lente convexâ distincta præstare visibilia, sed eversa
& minora.*

*Oculus collocetur post punctum concursus pro modulo sue faculta-
tis in certo aliquo puncto. Nam per LXXIIX. M^o videbit distinctè:
sed per LXXV. everso situ, & per XXCIV. minora justo: prout oculus
remotum aliquod distinctionis punctum postulat.*

*Haftenus de unâ lente convexâ: iam de junctis
convexis inter se.*

XXXVI. PROBLEMA.

*Duobus convexis majora & distincta præstare visibilia,
sed everso situ.*

*Duo convexa sint sic disposita ad oculum, ut remotius solitariè ad
oculum mittat imaginem eversam, non tamen distinctam, sed ut ocu-
lus lenti sit propior eo puncto in quo distincta representantur, per
LXXIIX. Ut si in schemate prop. LXXV. divergentia radiorum ab uno
puncto D C, D P, ejusq; angulis O D P esset nimis magna pro oculo, ocu-
lusq; in O P esset extra D. F. puncta concursus. Interponatur deinde
lens propinquior inter lentem illam priorem & oculum, hoc situ, ut o-
culus sit intra hujus punctum concursus, ut si in schemate Prop. LXX
& LXXV oculus esset in I G. Quo pacto oculus per hanc lentem solita-
riam videbit erecta confusa itidem: sed ob causam contrariam, per
Prop. LXXI. Ergò quia à remotiore lente, divergentia nimis est ma-
gna, hic jam à propiore convergentia contraria, illi nimie divergen-
tiæ medebitur, ut ita corrigatur, & emendata accedat ad oculum ad di-
stinctam visionem præstandam.*

Et quia imago rei visibilis est eversa per unam lentem: Lens verò propior non evertit denuò, quod accipit à Remotiori, sed sic ut accipit, ad oculum transmittit, ex supposito. Accipit autem respectu rei visibilis, imaginẽ eversam: Eversam igitur respectu rei visibilis ad oculum mittit.

Et quia imago ipsa eversa, prope punctum concursus, major apparet re ipsa, remotius aequalis; & adhuc remotius, minor, per *XXCIV.* imago igitur hac sic eversa, ubi fuerit ampliata per lentem propiorem, duobus primis casibus major omninò evadet re ipsa, ultimo casu vel major vel aequalis vel minor, prout fuerit lenti-um inter se proportio, quæ est in arbitrio artificis: certè tamen major, quàm quantam lens, oculo proxima, eam acceperat à lente remotiori, per *XXC.*


XXCVII. PROBLEMA.

Duobus convexis distincta præstare visibilia & erecta, sed minora.

Hæc duo convexa oportet in sufficienti discrimine esse convexitatum. Collocetur igitur oculus extra utriusq; puncta concursuum, alterius puncto distinctionis propior à reliqui puncto distinctionis remotior, ut ita neutro solitario eversa distinctè cernantur. Si enim fuerint lentes hoc situ cum oculo in eandem lineam compositæ, contraria vitia se mutuo tollent, & distinctio sequetur.

Vt autem & erecta sit imago, oportet eam bis everti. Et ut hoc fiat lentem propiorem oportet ipsam etiam esse remotam à remotiore ultra illius puncta concursus.

F 2 Sit




Sit enim AB visibile, CD , EF lens ab oculo remotior. Sit K punctum concursus. Si ergo imago ipsius AB evertitur hac unâ lente: punctum ubi imago apparet eversa, erit ultra K remotius à lente per $LXXV$: Sit ille locus L . & quia species ipsius lentis EF , cumq; eâ imago eversa ipsius AB , debet everti denuò per aliam lentem, quæ sit GH , imago verò rei AB eversa, comprehenditur lineis $ADFL$, $BCEL$: necesse est igitur lentem GH , esse ultra L , per $LXXVI$. Fuit verò L à lente EF remota ultra K punctum concursus. Ergò GH lens secunda multò longius removebitur, ultra K eius punctum concursus: ut FLG , ELH venientes ab extremitatibus rei, secundam refractionem in G , H . passi tandem iterum coeant, & cogantur ad oculum in I .

Deniq; hac imago minor est re visibili. Nam primum species ipsius EF (eorumq; quæ per eam videntur) eversa per lentem GH , & distincta apparens, erit minor in I , per $XXCV$. Sed per eandem, oculo in L constituto, ipsum etiam visibile AB per lentem CD eversum, minus occupare spacium videtur in lente, quàm pro suâ magnitudine. Quia L non potest esse proximum ipsi K puncto concursus, ne nimia sit confusio. L enim proximum esse debet puncto distinctionis, ut & I . Gemino igitur nomine visibile AB representatur parvum.

XXCIX. PROPOSITIO. PROBLEMA.

Duobus convexis pingere visibilia super papyro situ erecto.

Problema diu questum. Habeant igitur convexa ut prop. $XXCVII$. scilicet ut lens propior papyro sit ultra K



tra K puncta concursus. Nam penicilli circa K desinentes in acumen ultra K dilatantur iterum, & divergant à se mutuo. Eos itaq; lens convexa altera excipiens, nova refractione facta & acuit iterum singulos, & convergere inter se facit universos ad novam sectionem, quâ superatâ jam divergunt, & sic in papyrum primitivo ordine acuminibus suis incidunt. Fit enim in schemate p. LXXXVI. non secus ac si jam visibile CE , esset in DF picturam translatum & OP sit jam non oculus sed secunda lens infra illud. Quod si lens OP sit proximè infra picturam DF , pictura TV postulat papyrum remotam, & fit magna.

XXCIX. PROBLEMA.

Tribus convexis erecta & distincta & maiora præstare visibilia.

Duo convexa & oculus sic accommodentur, ut fiat quod dictum prop. XXCVII. demto hoc unico, ut oculus sit propior puncto distinctio- nis, videatq; confusè. Nam tertium convexum sic applicatum, ut est factum p. XXCVI. cum secunda ibi lente, scilicet ut oculus sit propior lenti quàm punctum concursus, faciet ut species (quæ bis eversa fuit, & jam erecta est, eoq; minor reddita) rursus augeatur: quod si justa fuerit lentium proportio, augmentum superabit priorem diminutio- nem per duas solas factam, in XXCVII. Distinctio verò ex ijs causis se- quetur, quæ sunt allegata p. XXCVI.

Hactenus de lentibus convexis: sequitur de Cavis.

XC. PROPOSITIO.

Radij ab uno lucente puncto paralleli vel divergentes, si fuerint ingressi in cavam densioris superficiem (siquidem punctum lucens extra centrùm superficiem fuerit) divergunt plus per corpus densi.

Ex A lucenti puncto descendant radij divergentes AB, AC , in BC


F 3 cavam

cavam densioris superficiem, cuius centrum sit D , intra complexum AB, AC . Dico AB, AC refractionem passos in BC , diversuros amplius infra BC . Ducantur enim ex D centro perpendiculares in superficiem DB, DC , & continuentur aliquousq; in E, F . continuentur & AB, AC in GH . Cum ergo AB inclinatur super densioris superficiem, refringetur in B , & refractus à BG declinabit, versus BE perpendicularem per II . Sit BL similiter & AC refringetur in C , & refractus à CH versus CF perpendicularem declinabit, ut sit CM . Sed DBF, DCF plus divergunt, quia à propiori puncto quam AG, AH à remotiori per eadem BC puncta traducti. Et BL, CM ad eos plus divergentes accedunt, à BG, CH minus divergentibus recedunt, plus igitur divergunt, quam AB, AC , idq; intra corpus densum.

XCI. PROPOSITIO.

Si punctum lucens propius fuerit lenti centro cavitatis, divergentes, refractione factâ, minus divergent intra corpus densum.

Sit enim jam A centrum circuli, D punctum radians. Erunt igitur ABG, ACH perpendiculares, & DB, DC radij, qui cum deberent pergere viam BE & CF , refringuntur in B, C punctis, & accedunt



dunt ad perpendiculares BG, CH , fiuntq; BL, CM , qui minus divergunt, quàm BE, CF .

XCII.


Divergentes intra corpus densius versus cavum eius terminum, eo transito divergunt amplius.

Divergant BL, CM versus cavum densi terminum LM , cujus centrum P , ex quo perpendiculare in puncta L, M , veniant PL, PM . Et BL, CM producantur in Q, R , ultrà incidentias L, M . Quia igitur radij BL & CM versantes intra densum, obliquè incidunt in superficiem LM varioris corporis P, P , seu, quod idem est, in terminum densi, in quo sunt; refringentur discedentes à perpendicularibus PL, PM , & refracti erunt, non LQ, MR , sed exteriores per II . Sint LN, MO . Et cum BL, CM, R , divergant: LN, MO divergent amplius.

XCIII. PROPOSITIO.

Si radij per corpus densum inceserint paralleli, transito cavo ejus termino divergent.

Sint paralleli $\beta\delta, \gamma\epsilon$, eorum non plures uno possunt esse in $\beta\gamma$ perpendiculares, reliqui obliquè illapsi refringentur à suis perpendicularibus per II , ergo divergent, ut prius, foras egressi $\beta\zeta, \gamma\kappa$, & sic per alterum earum $\delta\epsilon$ egressi divergent in $\delta\theta, \epsilon\kappa$.




XCIV. PROPOSITIO.

Radij divergentes versus lentem, quocunq; ad lentem situ puncti radiantis, si lens vel utrimq; cava utcunq;, vel altrinsecus etiã plana fuerit, transitâ lente semper divergunt amplius.

Nam si non hoc verũ est, non verũ erit de situ puncti radicalis intra centrum cavi, quia tunc per XC intra corpus minor est divergentia. Item non erit verum, si lens sit altrobiqu; plana. Et minimè erit verum

si con-

si concurrat conditio utraq₃. Atqui verum est, utraq₃ concurrente. Sit enim parallelepipedum densum CB, ED , radij in eo, contra se inclinati EC, DB , equalibus angulis CED, BDE : ij refringentur in punctis C, E, B, D : refracti EG, CA per III, erunt paralleli, item GF, BA , quia CB, ED paralleli. Aequalis igitur divergentia in AC, AB , illi in EG, DF . Excavetur jam CB , circulo CHB . Minuetur igitur inclinatio EC super cavam superficiem, quare minor etiam erit refractionis, superior itaq₃ refractus, puta CI & in altero BI . Minus igitur divergent jam IC, IB quam EB, DF . Et multò minus si etiam in ED excavetur, quia CE super novam superficiem magis inclinabitur. Et refracti magis divergent, quam nunc EG, DF , ut si sint EL, DO .



XCV. PROPOSITIO.

Visibilia longinqua lente satis cavâ in uno puncto ab oculo τὸ μύωπ & collocata representantur distincta.

Nam longinqua puncta radiant parallelas per XXIII. Cum ergo μύωπες sint assvefacti ad propinqua; ad divergentes igitur assvefacti sunt per XXIV. eog₃ confuse vident remota. At cavæ lentes faciunt radios parallelas divergere per XC. Faciunt igitur ut eorum parallelorum radiorum puncta distinctè videantur. Non tamen in omni situ cavæ lentis. Nam punctum idem A per cavam lentem CE remotiorem ab oculo BD , radians in pupillam oculi BD , parvâ lentis portione CE utitur: quippe quod in ampliorem radiat, id nimia divergentiâ aberrat ab oculo. Contra idem A punctum propinqua lentis OI , majore utitur portione OI , ad radios ab A , spargendos in totam pupillam BD . At parva portio CE propior est perpendiculari ex A in lentem, quam

ampla OI : minor igitur AC, AE radiorum propiorum ad superficiem inclinatio, quàm radiorum AO, AI , ideoq; & minor refractio ACB, AED quam AOB, AID per X . & propterea minor divergentia CB, ED , quàm OB, ID . Iam verò cuilibet oculo sua certa divergentia prodest: certus igitur cujusq; lentis situs.

XCVI. PROPOSITIO.


Visibilia per cavas lentes repræsentantur minorâ.

Sit enim in priori schemate jam BD visibile & A centrum oculi. Cum ergò radij ex A in lente CE refringantur extrorsum, per $XCIV$, patet connexis BA, DA , majorem futurum angulum BAD , quo videtur visibile libero oculo, quam CAE , quo angulo videtur DB per lentem CE , per $LXVI$. igitur minor putabitur. Nescit enim oculus, quid radijs AC, AE accidat in C, E punctis: eoq; putat, illos rectis continuari per XIX . quod si fieret, ÿ certè non nisi partem de visibili AD interciperent. Capiunt autem totum visibile refracti. Ergo species totius, æquatur parti totius, eoq; minor est ipso toto.

XCVII. PROPOSITIO.


Si longiùs cava lens recesserit ab oculo, pauciora visibilia per cavam ad oculum venient.

Sit oculus A . lens BC propior. Sit rursus oculus D , lens $E F$ remotior, & æqualis priori BC . Basis igitur $E F$ æqualis est basi BC , latera verò DE, DF longiora lateribus AB, AC . Angulus igitur BAC major Angulo EDF . Refringantur jam radij & sint refracti $BG,$



G CH &

CH & EI, FK per XCIV. semper igitur plus divergunt BG, CH quàm EI FK. Sit enim ELF triangulum applicabile ipsi BAC. Cum ergò à D & L descendant DE & LE in idem punctum E superficiei densioris, ij refractione factâ in E se mutuò secabunt, & LE inferior evadet in EM superiorem: sic LFin FN. per XI. Plus igitur EM, FN. divergunt, quàm EI, FK, plus igitur & de hemisphærio intercipiunt: quare & BG, CH plus intercipient, à lente propinqua, quàm EIFK à lente remotâ refracti.




XCIIX. PROPOSITIO.

Si longius cava lens recesserit ab oculo, minora repræsentantur visibilia, quantisper lens non propinquior fit rei visibili, quàm oculo.

Aequaliter enim ad sensum cum remotione lentis, decrescit ejus visibilis magnitudo per LXVII. At non aequaliter pauciora recipit visibilia longius distantia. Etsi enim per XCVII. semper pauciora recipit, illa tamen diminutio exigua est pars universorum siquidem remota fuerint visibilia, propterea quod refractiones in majori remotione penè nihil mutantur cum & inclinationes (in priori schemate) radiorum LE, DE, &c. super lentem EF in majori remotione penè nihil mutantur. Plus igitur detrahatur de magnitudine aspectabili quàm de multitudine rerum per lentem visarum. Universa igitur minori angulo cernuntur: quare & singula.

Aliter:

Aliter: Sit oculus A, radij rectilini ABF, ACG, angulum FAG comprehendentes; ij secent lentem propinquam BC, & remotam FG. Refringentur igitur extrorsum in BC punctis per XCIV. Sint refracti BE, CD. Cum autem in FG majorem lentis portionem intercipient AF & AG: Major etiam erit refractione in FG, quam in BC, per XI. refracti igitur in FG exeuntes divergent amplius, quam qui ex B. C. exeunt, concurrent igitur cum illis. Concurrent & sit concursus E. D. & refracti hi FE, GD. Cum igitur FE, GD post concursum & sectionem fiant exteriores quam BE, CD, nullum igitur visibile (praterquam cujus termini sint in ipsis punctis concursus E. D.) tam ex propinqua quam ex remota lente simul eodem angulo BAC, vel FAG spectabitur. Nam visibilia remotiora, quam ED, ut visibile HI. comprehensum refractis propinqua lentis BI, CH. non comprehendetur refractis FE, GD eodem Angulo FAC ad oculum venientibus, sed interioribus intra FG, qui minori angulo ad A Oculum veniunt, minora igitur apparent per remotiorem GF, quam per propinquorem CB. per LXVI.



XCIX. PROPOSITIO.


Cavalens, si proximè oculum sit applicanda, aut omnibus hominibus in certo intervallo, ut cum perspicilla naso inequitant, tum cuiq; sua propria est, ad distinctam visionem efficiendam.

Nam per XCV. Cavalens qualibet habet certum intervallum pro facultate oculi ad distincta videnda. Erepta igitur electione intervalli, concedenda est oculo electio lentium, aut confuse videbit longinqua. Aut enim non satis cava erit lens, & sic non tollet confusionem ex parallelitate radiorum, aut nimium cava, & sic nimiam inducet convergentiam, & sic confusionem contrariam priori.

C. PROPOSITIO.

Lentes, quæ propter nimiam cavitatem proximè oculum reddunt confusa; ex aliquo intervallo reddunt distincta, & contra.

Est veluti conversa Prop. XCV. Radiet enim A visibile punctum in lentem BC cavam: Igitur radiationes omnes facta refractione divergent à se invicem per XCI. & XCIV. proptereaq; remotiores à se mutuo, divergent magis. Sit radiationum AB, AC diversio BF, CG, eaq; nimia pro oculo. Contra sint radiationes AD, AE divergentes in DH, EI, appropriatae oculo. Sit autem pupilla amplitudo HI & situs ejus in HI, ubi divergentes suos complectitur: quæ si divergentes FG completeretur vitiosam visionem & confusam ipsius AB puncti causaretur. Atqui HI amplitudo pu-



pille applicata lenti in KL jam amplectitur & intercipit nimis divergentes FG; confusè igitur videbitur punctum A, in situ oculi KL, distinctè in situ oculi HI.

Haecenus seorsim de convexis, seorsim etiam de cavis: sequitur nunc de junctis cavis & convexis.

CI. DEFINITIO.

Tubus usurpatur pro opaco cavo cylindro, cuius bina ostia clauduntur vitris perspicuis; scilicet pro oculari illo instrumento, quo res longinquas quasi cominus aspiciamus.

CII.


Ostiorum eius alterum cum suo vitro ad oculum pertinet in situ utili, alterum ad visibile.

CIII. POSTVLATVM.

Vt in tubo linea per utriusq; vitri centra convexitatum & cavitatum transiens, sit una & eadem. Hoc est, ut parallela sint vitra, ijsq; tribus re-ctis angulis insistat,

CIV.

Si cava lens radiationes unius puncti quæ trajeclâ lente convexâ refractionem passæ convergunt, inter-



G 3 cipiatur

cipiat antequam illæ veniant ad punctum sui concursus: aut punctum concursus prorogabitur in longinquum, aut radiationes incedent porrò parallelæ, aut denique rursus divergent.

Nam convergant NL , OM , versus cavam LM ac si essent concursura in puncto λ' . Igitur refractione factâ in LM , jam refracti LB , MC incedentes per corpus densum minus convergent versus BC cavam superficiem alteram, ac si essent concursura in puncto D , per $XCII$. conversam. Per eandem verò, LB , MC secundam refractionem passis in BC , refracti BA , CA minus adhuc convergunt & denique concurrunt in A . Et sic concursus A elongatur, debuit enim in λ' fieri.

Quòd si sit paulò major refractione, tunc ultimi refracti BA , CA excurrent in infinitum priusquam concurrant per XC conversam.

Denique si prima refractione tanta sit, ut $\rho\delta$, $\kappa\epsilon$ convergentes versus $\delta\epsilon$ fiant intus paralleli $\delta\beta$, $\epsilon\gamma$, tunc per $XCIII$. conversam rursus divergent in $\beta\zeta$, $\gamma\kappa$.

CV. PROBLEMA.


Visibilia lente cava & convexa pingere super papyro majori quantitate, quàm per solam convexam, sed eversa.

In schemate Prop. $XLIV$. sit lens convexa GH , puncta concursuum, seu apices penicillorum. F , B , D . interponatur lens cava LN paulò supra FBD . Tunc visibile CAE pingetur primò super lentem cavam propè DBF . sed paulò confusius, quia lens cava intercipit apices penicillorum: & pingetur everso situ, quia sectio penicillorum $j m$ est facta in GH & apices penicillorum jam penè à se mutuo exerti sunt, singuli intra se in angustum coacti. Transeuntes igitur cavam lentem penicilli singuli, per CIV , aut in acumen desinunt longinquius SPT , & tunc pictura super papyro ibi applicata sit distincta, aut paralleli incedunt unius penicilli radij, & tunc pictura manet in ea confusi-

confusione parvulâ, quâ primitus in cavam lentem venit, aut deniq; divergunt & dilatantur penicilli, & tunc magis magisq; confunditur pictura cum discessu papyri à lente cavâ. Major autem redditur pictura SPT. quàm FBD per solam GH convexam, quia penicilli F, D. refracti in cavâ LN incurvantur extrorsum in S. T. per XC. exteriores semper plus, quàm interiores, per II.

CVI. NOTA.

Quod I. Baptista Porta profitetur radios solis primum colligere, post collectos in infinitum mittere, & sic comburere, etsi de speculis loquitur, videtur tamen de perspicillis intelligi deberé, quia de industria occultavit sententiam. Quod si de lentibus intelligi debet, non aliud erit artificium, quàm primùm lente convexa colligere multos radios, post sic collectas proximè punctum concursus excipere lente cavâ, quæ ex convergentibus parallelas faciat, ut dictum prop. CV. Itaque vide ea, quæ prop. LVI. sunt dicta contra. Quibus jam addo & hoc amplius, & si emendaveris in Portæ verbis illud de lineâ ustoriâ infinitâ, ut sit scil. idem quod conus ustorius, quantum velis protensus, ut ita adhuc per sectionem radiorum
 non incen-



incensio quærat in fine coni; tamen nihil profici. Nam si sectio causatur incensionem, fortis sectio fortem præstabit incensionem, debilis debilem. At in longissimi coni vertice debilissima erit sectio.

CVII. PROPOSITIO.

Cavâ lente proximè oculum positâ, quæ solitaria confusa præstaret visibilia; quæcunq; lens majori circulo convexa in unâ certâ remotione à cavâ distinguit visibilia & auget.

Nam per C. cavæ lentes de circulo nimis angusto, si proximè oculi applicentur, confusa reddunt, propter nimiam radiorum divergentiam. Sed per LXXI. radiationes unius puncti per convexam lentem solitariam oculo posito intra centrum concursus præstant confusam visionem propter convergentiam.

Et per CIV. illa nimietas divergentiæ, & hæc convergentia, lentibus in tubum compositis se mutuò tollunt. Sublata ergo convergentiâ & emendatâ nimia divergentiâ, sequitur distinctâ visio. Tollitur autem, quod nimium est, divergentia in unâ quâlibet lente cavâ proximè oculum, per certam convexa lentis remotionem ab oculo. Nam lente convexa prope oculum existente, remedium nimie hujus divergentiæ (convergentia) est in parvâ quantitate. Vt in schemate prop. LXX. lente cavâ in IG existente extremi radij AI, HG intercipientes portionem cavæ lentis IG convergunt angulo parvo IFG. Rursum convexa discedente ab oculo remedium est in magna quantitate. Vt si lens cavâ cum oculo paulò supra F sit, extremi radij unius puncti C erunt AF, BF, angulo AFB majori eandem cavæ lentis portionem intercipientes.

Majori autem circulo convexa lens requiritur, quia si circulus convexitatis circulo cavitatis esset æqualis, ut convexum illius in cavum hujus sedere & reliqua illius convexitas, quasi parallela esset reliquæ

que hujus cavitati, tunc lentes immediatè junctæ sese mutuò ferè emendarent & altera alterius actionem aboleret, sicut in alterius excessu nullam vel vilem medicinam repositam haberet oculus confusione laborans in remotis videndis. Divulsa verò hac continuâ lente, à cavâ, plus etiam convergerent radij in cavam incidentes, & sic à cavâ ne paralleli quidem amplius effici possent, nedum divergentes. Eadem multò magis in convexam minoris circuli competunt. Relinquitur igitur majoris circuli convexitas idonea.


Deniq; dico augeri speciem visibillum, si circulus convexitatis major sit. Nam per *XXC.* convexa lens solitaria auget visibilia. Etsi verò per *XCVI.* concava lens etiam solitaria minuit visibilia, verumq; est, & lentem convexam, & quæ per eam videntur; majora esse, si solitaria sit convexa, quàm si interponatur concava: tamen per *XXCII.* & *XCIII.* hæc augmentatio & hæc diminutio major est in remotioribus. Cum ergò cava sit propè oculum, penè nulla erit ejus diminutio: & cum convexa longius ab oculo remota sit, major erit ejus augmentatio.

CIIX. PROPOSITIO.

Convexo posito in quacunq; distantia ab oculo, quodcunq; cavum, quod solitariè applicatum oculo, confusa præset visibilia, quodque sit minori circulo cavum quàm quo utitur convexum, in certa distantia & situ inter oculum & convexum, distincta exhibet visibilia.

Est quasi conversæ prioris sed liberior. Illic enim cavæ lentis situs erat datus proximè oculum, ideoq;

H. unicus,



unicus, eligi contra poterat situs convexa. Hic jam convexa lentis situs datur sed non unus, verum multiplex in quantitate & qualitate, & vicissim eligi potest situs cava lentis.

Detur primò hæc qualitas situs convexi, ut sit oculus intra punctum concursus: tunc major est cognatio propositionis cum priori & propria speculationi tubi-ocularis.

Tunc igitur in schem. proximo, ex prop. LXX. repetito, cava lentis & oculi situs erit inter lentem convexam AB & puncta concursus D. F. sit in IG. certus igitur erit modulus convergentia radiorum AI HG angulo IFG: quæ convergentia, ut ne impediatur distinctam visionem, tollenda est vel sola, pro oculo $\pi\epsilon\iota\sigma\ \epsilon\upsilon\tau\omicron\nu\upsilon$, ut radij fiant paralleli, vel insuper etiam inducenda divergentia pro oculo $\mu\upsilon\omega\pi\ \Theta$. Atqui per CIV. utrumq; præstari potest per cavam lentem, positam in aliquo puncto ante concursus puncta. Illam verò oportere esse minori circulo cavam, quàm quo utitur convexa, demonstratur ut prop. CVII. Sed & cavam oculo solitariè, proximè applicatam oportet confusa præstare visibilia. Quia id quod medetur confusio per convexum, oportet etiam præstare confusionem ex causa contraria.

Esto secundò hæc qualitas situs oculi ut collocetur extra puncta concursus, ut si in schem. proximo ex prop. LXX. & LXXV. repetito esset in OP, extra D. F. Tunc igitur cava lens applicata, intra punctum concursus D vel F. per CIV. præstare poterit, ut nullus fiat concursus, sed ut radij iterum divergant: & sic veniant ad oculum OP. Veruntamen in hoc casu multæ requiruntur circumstantiæ. Primum enim lentem cavam esse oportet parvo circulo. Nam si magno cava esset, universi radij inter AD; BD parvam ejus portionem interciperent, proximam perpendiculari, ideòq; in refractione parvi effectus, & non tanti, quo tolli posset convergentia. Hoc est huic casui commune cum priori. Deinde si lens est parvo circulo cava, ut divergentiam inducere possit, tamen divergentes illos non mittit omnes ad oculum, longe.

longè extra D. F. concursus puncta collocatum. Nam si radij divergunt, aberrant igitur circumcirca ab oculo eminus posito. Relinquuntur igitur paucissimi per ipsum convexæ lentis umbilicum (aut aliud aliquod ejus punctum pro situ cavæ) angustissimæ portionis transmissi in ipsam fundum D cavæ lentis propè perpendicularem, qui penè nullam habent divergentiam, eoque pro parallelis haberi possunt. Quo nomine tantum τὸς πρὸς ὄφθαλμῳ serviunt. Tertio tenuissimam visibilis particulam hic situs ad oculum transmittet, propter oculi, O P elongationem & ab A B lente convexa (per dicta), & à cavâ supra D, vel F locandâ per XCVII, & insuper id quicquid est minimo angulo per XCIIIX.

CIX. PROPOSITIO.

In Instrumentis, majora & distincta exhibentibus visibilia, nulla cava lens valde longè abest à punctis concursus, post lentem convexam existentibus.


Nam si quàm fieri potest maxima representent, cavam lentem oportet esse proximè oculum, per XCIIIX. Convexam verò longè ab oculo, per XXCII. Quare & longè à lente cavâ; & tamen lentis cavæ locus per CIV, est inter convexam & ejus punctum concursus. Si ergo convexa est longè à cavâ remota, punctum concursus erit proximum cavæ lenti.

CX. PROPOSITIO.

Proposita lente convexâ, cavarum lentium oculo proximè applicatarum, quæ minori circulo cava est, ea longius à convexo distat, & propius ad punctum concursus applicanda est.

Lentis convexæ A B portio D E radios ab eodem puncto fluentes transmittat, & sit concursus C.

Cum igitur per unam lentem convexam AB (eiusve portionem DE unam & eandem) eadem sit convergentia radiorum DC, EC , unum & idem debet adhiberi remedium, divergentia scilicet per lentes cavas. At divergentiam causatur refractio, refractio verò ejusdem radij, ut DC non nisi in similibus inaequalium lentium cavorum portionibus eadem esse potest. Sint ergò cavæ lentes FG & HI . Et quia similes sunt portiones FG , & HI qualibet de sua lentis cavitate; abscindenda verò sunt à radijs ijsdem DC & EC . Erit igitur ut FG majoris cavitatis portio ad similem HI minoris cavitatis portionem, sic etiam FC distantia illius à concursu major ad HC minorem. Quod si HI minus à C distat quàm FG , plus à DE distabit eadem HI , quàm FG lens majore circulo cava.



CXI. PROPOSITIO.

Cavum unum & idem oculo proximè applicatum, ut cum convexis diversis distincta exhibeat, ab omnium illorum concursibus æquali intervallo debet abesse.

Nam una lens cava unum tantum præstat remedium; unam ergo solam emendat radiorum convergentiam. At in eadem distantia lentis cavæ, à concursibus quarumcunq; convexarum, est eadem convergentia radiorum qui quidem ab eadem cava lente excipiuntur. Nam si maximè latior sit lens altera ex convexis, & extremi ejus radij magis convergant: ij tamen aberrabunt à lente cava vel ab eâ portione lentis, cujus refracti in pupillam oculi venire possunt.

CXII. PROPOSITIO.

Proposi-

Propositâ lente cavâ propè oculos lentes magno circulo convexa longam requirunt distantiam à cavâ & oculo, parvo brevem.

Nam per CIX oculus est prope punctum concursus, & per CXI, lens concava, speciei ubiq, ejusdem, abest eodem intervallo à concursibus omnium convexarum. At concursus à suis convexis absunt inaequaliter: Nam à lentibus magno circulo convexis absunt longè, à parvo minus per XXXIX. Cum autem aequalia ablata ab inaequalibus relinquunt inaequalia, & intervallum, cavam inter & convexam, eadem ubiq, distantia concursuum à cavâ, minus sit eo intervallo, quod est inter convexam & concursum: cava itaq, (cum oculo) longius ab erit à majoris circuli convexo, quàm à minoris.

CXIII. PROPOSITIO.


Proposito convexo, cava minoris circuli repræsentât visibilia majora, majoris minora.

Nam per CX. Cava parvi circuli eam oculo cui proximè junguntur, recedunt longius à convexo ad distinctam visionem impetrandam. Sed per XXCII. quo longius recesserit oculus à convexo versus punctum concursus, hoc videt res majores. Ergo oculus cum cavâ lente minoris circuli res distinctè visas majores videt, quàm cum cavâ majoris circuli.

CXIV. PROPOSITIO.

Lens cava brevissimo intervallo longius digressa à convexâ, multum auget visibilia.

Nam per CIX. In schemate sequenti GH, IK sunt punctis C. F. valdè propinqua. Et verò tam brevi spaciolo IF trajecto & oculo IK in F collocato, quantitas unici puncti, à quo radij omnes in DE



H 3

inflaunt,

influent, excrefcit in aliquam magnitudinem, æqualem quippe toti lenti D E, ut punctum videatur angulo D F E, quæ est multiplicatio infinita. Levi igitur momento magni quid præftatur.

CXV. PROPOSITIO.

Propofitâ lente cavâ proximè oculum, convexarum lenti-um, quæ minori circulo convexa eft, minora repræfentat vifi-bilia, quæ majori, majora.

Sit lens convexa A B, femidiametro majori A C, & lens D E femi-diametro minori D F. Erunt igitur C. F. puncta concursus per XXXIX. Detur utrimq; una lens cava G H vel I K, quæ proximè ocu-lum pofita, certa fui portione certam parallelorum radiorum diver-gentiam caufetur. Cavum igitur cum fit unum & idem propofitum G H. I K erit in eodem fitu à C. F. punctis concursus per CXI. Ocu-lus verò eft proximè lentem utrimq; ex fupposito. Aequalibus igitur acuminibus G C. I F ablatis ab inæqualibus A C, D F, quæ fupfunt A G, D I in majori erunt proportione. Plus igitur in fuâ proportione removetur A B convexum à G H cavo & oculo, quàm D E convexum ab I K cavo & oculo in fuâ proportione. Et G H cum oculo, eft pro-prior ipfi C in proportione ipsius A B C quàm I K cum oculo, ipfi F. in proportione D E F. Majora igitur vifibilia repræfentantur per A B, G H quàm per D E I K per XXCIII. Et quidem leviffimâ alteratione proportionis, valde majora, per CXIV.

Hæc capitalis Propofitio abftrufiffima fuit, idq; ideò, quia, fi quæ eft proportio, A C ad C G eadem fuiffet ipsius D F ad F I, tunc nihil feciffet A G longior, quàm D I ad augenda vifibilia. Omnia enim fuiffent utrimq; æqualia per LXXXIII.

CXVI. PROBLEMA.

Vifibilia pro lubitu magna repræfentare.

Nam

Nam per CXIII. CXV. patet, auctā proportione circularum cavitatis & convexitatis, augeri visibilia.

CXVII. PROBLEMA.

Inæquali lentium distantia, hoc est inæqualibus tubis repræsentare visibilia, æquali augmento magnitudinis.

Fac per CXIII. CXV. ut sit eadem proportio & cavitatum inter se & convexitatum, & distantiarum inter lentes, convexis ipsis inter se dissimilibus.

CXIX. PROBLEMA.

Brevioribus tubis repræsentare majora.

Si convexo minori existente, major erit proportio inter convexitatem & cavitatem quàm in instrumento longiori, majora breviori instrumento repræsentabuntur per CXIII. & CXV.

CXIX. PROPOSITIO.

Posito concavo, clarius seu fortius repræsentantur visibilia, majori seu latiori convexo, quàm minori.

Plus enim lucis spargitur ab uno puncto (in proximo schemate) per amplitudinem AB majorem, quàm per DE minorem. Ea verò omnis cogitur in unum punctum C vel F. In C igitur fortior est pictura quàm in F, & oculus in GH stipatiores excipit radios quàm IK.

Magnitudinem autem convexi intellige hic ex XXX, de corpore lentis, non de figurâ.

CXX. PROPOSITIO.

Posito convexo, visibilia repræsentantur clarius seu fortius per cavum majoris circuli, quàm per minoris cavum.

Parva

Parva enim lens proximè oculum, parvâ sui parte justam causatur radiorum divergentiam. Etsi igitur multiradij unius puncti in illam radiant & à magna portione convexæ lentis radiant, pleriq; tamen eorum nimia refractione quam latera seu limbus cavæ lentis causatur circumcirca aberrant ab oculo (ut in schemate prop. C. FG ab HI latitudine pupillæ): ingrediuntur verò oculum radiationes non nisi pauca & perpendiculari omninò proxima, & sic à parvâ portione convexæ lentis allapsa: quare per CXIX. debilis est visio per lentem parvo cavitatis circulo. Idem fit si de cavitate magni etiam circuli sit portio angusta & minor pupillâ.

CXXI. PROPOSITIO.

Portionis de hemisphærio, per lentes visæ pars media & perpendiculari proxima clarius & fortius videtur, quàm limbus circumcirca.

Causa ad oculum patet in schemate prop. LXX. in quo sit latitudo pupillæ QG. Oculus enim in QG, seu nudus seu prætenta lente cavæ collocatus, puncti E medij radiationes omnes inter EAQ, EBG intercipit, puncti verò C non omnes sed penicilli CAFBC partem saltem excipit, scilicet quod est inter CA, ICHG: quod verò jam est inter CHG, & CBF id aberrat à pupilla QG. Quare cum E videatur per AB, C verò per AH: per CXIX. fortius & clarius videbitur E, quàm C.

CXXII.

Angustâ lentis convexæ portione, cæteris paribus, distinctiora repræsentantur visibilia, latâ confusiora.

Nam quæ per magnam portionem convexitatis in oculum radiant, illa per CXIX. fortius radiant, quâ fortitudine primum Iridis colores, inde nebula excitantur. Oculi enim cavæ & retiformis tunica est spiritu plena, & licet à puncto solum tangatur, tamen si id punctum ex concursu radiorum multorum sit immoderatè lucidum, spiritus in aliquâ

aliquâ latitudine retiformis circa hoc punctum imbuuntur contagione passionis penetrantis vide LXI. Itaq; pro commoditate oculi, instrumenti & lucis diurna vel nocturna ampliatur & retegitur convexa lens aut angustatur & regitur: seu immediatè, seu loco intermedio inter lentes, adhibito diaphragmate pertuso, aut collo instrumenti introrsum flexo & angustato, aut productione tubi ultra lentem convexam, ut ejus cylindracei orificium remotius, per LXVII. minori angulo cernatur, valeatq; tantum quantum angustius aliquid. Natura præludit ampliatione foraminis uveæ ad lucem nocturnam, contractione ad diurnam.


Habet diaphragma & hunc usum, ut intus obscuritatem faciat, quorsum & color niger intus obductus servit, & litui figura, progressu extrorsum flexa habens latera, in medio introrsum, ne radij propè convexam ingressi rursus prorsumq; revibrentur & claritatem faciant.

Eodem servit & productio tubi longè ultra lentem convexam, ne convexum irradietur à lateralibus hemisphærij partibus.

CXXIII. PROBLEMA.

Visibile in sublimi, in profundo, à dextra, vel sinistra, & ubi velis, videre.

Fit si cavæ lentis diameter sit latior pupilla oculi, & satis larga, ut oculus à centro ejus justo spacio ad latera possit exire.



Nam penicilli in lateribus cava refringuntur toti & obliquè: sinisterorsum in sinistris, dextrorsum in dextris. Sit enim in schemate prop. C. ABK F linea media unius penicilli veniens in centrum pupille, illa per BK puncta refringitur extrorsum ad sinistram, quia & BK est pars lentis sinistra. Oculo igitur à medio cavi translato ad latus sinistrum K : punctum A per rectam FKM visum, putabitur esse in M situ dexteriori, per XIX.

CXXIV. PROBLEMA.

Magnitudinem ampliatae speciei artificiosè æstimare.

Dirigatur sinister oculus in rem visibilem sine instrumento liber; dexter verò trans lentes eandem aspiciat. Cum igitur sinister sit in visibile directus, dexter autem sinistro sponte sua semper maneat parallelus, si tegatur ut jam instrumento legitur, quippe parallela oculorum directio est naturalis per LVII. Dexter igitur, quasi in visibile ipsum directus erit, sive ei species Instrumentaria humilior, sive alior videatur reipsa per oculum sinistrum visa. Nam per LXII. videbit quidem dexter oculus speciem ampliataam rei illius, in quam rem ipse per associationem sinistri dirigatur, sed non ideò videbit illam eadem semper sui particulâ, quâ sui particula sinister eam videt.

Quando ergo situ discrepare videbuntur species, lente convexa instrumenti huc illuc motâ, interdum & concavâ paulò aliter oculo applicatâ, facile efficietur, ut species utraq; visibilis ejusdem, inter se situ congruant. Tunc igitur apparebit excessus alterius supra alteram, applicatis invicem speciebus.

Haftenus de instrumento simplici: sequitur $\kappa\rho\upsilon\psi$.

CXXV. PROPOSITIO.


Posito.

Posito cavo duo convexa similia, applicata invicem proximè, pro uno, ferè dimidiant longitudinem instrumenti, quod eorum convexorum unum solum habet; & simul quantitatem speciei minuunt.

Sint duo convexa AB , & CD similia & centrum circuli ipsius AB sit H . Sit q semidiameter HR bisecta in I . Posito igitur unico AB convexo, punctum concursus erit circa H , per XXXIX. Ac ideò lens cava non longè intra H ponenda erit per CIX.

Dico CD proximè ad AB applicatà, cavam lentem intra I applicandam. Id probò primum rudi Minerva.

Nam quia paralleli radij in AB refracti concurrunt ad H propter refractionem; intercepti igitur à CD , ideò refractionem in CD iterum passi, propius concurrent. In CD enim majorem patiuntur, quàm in AB , quia obliquius in illam incidunt, quippe in AB incidunt paralleli, in CD jam convergentes. Patet hinc concursum radiorum futurum propius multò ac proinde cavam lentem appropinquare debere ipsis convexis AB & CD per CIX. Referendam autem esse lentem cavam intra I punctum quod dimidiat semidiametrum HR ipsius convexitatis AB , patet inde. Sit enim ipsi HI dimidia equalis GL , & hac circuli semidiametro fiat lens EF convexitatibus ELF , EMF , & ipsi LG sit equalis GK . Ergo per LXXIX. si esset unica superficies EMF , illa equè valeret, duabus ipsis AB , faciens parallelòs concurrere in K , quod equè distat ab EF ac H concursus distat ab AB . Atqui lens EF habet duas tales superficies. Et sicut superficie EMF complexa est convexitates ambas ipsius AB , sic superficie altera ELF complectitur convexitates ambas in CD



I 2 quippe

quippe AB & CD sunt similes, sicut & ELF , EMF . Sed EF lens utrimq; convexa parallelos concurrere facit in G . Centro per XXXIX. Hoc est in distantia LG . quæ est ipsius semidiametri de AB dimidia. Ergò & AB , CD lentes associatæ & contiguæ cogunt parallelos in distantia dimidia hujus semidiametri, hoc est, circa I punctum. Cava verò lens, per CIX. intra punctum concursus locanda est, ergo intra I . Dico etiam speciem fieri minorem per duas convexas invicem contiguas AB , CD , quàm per unam AB .

Nam quia una cava lens est utrimq;, eandem igitur causabitur radiorum divergentiam. Eodem igitur intervallo aberit tam ab H concursu per unam AB , quàm ab I . concursu per utramq; AB , CD causato: per CXI. sit hæc distantia HN , IO , GP . At portio eadem ad dimidium IR majorem habet proportionem quam ad duplum HR . Propiores igitur sunt AB , CD junctæ, ipsi O (vel EF illis æquipollens ipsi P in sua semidiametri LG proportionem), quam sola AB ipsi N in sua RH . Minora igitur visibilia EF representat per cavam P quàm AB sola per cavam N eandem per XXCIII. minora igitur & duæ AB , CD junctæ, quàm una sola AB .

CXXVI. PROPOSITIO.

Vnica superficies concava parvo circulo in dissipandis seu disgregandis radijs ferè æquipollet duabus superficiebus concavis ex circulo duplo majore desumptis.

Probatur ex LXXIX. & III.

CXXVII. PROPOSITIO.

Duæ lentes concavæ invicem contiguæ paulò admodum à lente convexa longius distant, quàm earum unica: ut distinctam efficiant visionem, sed speciem visibilis multum ac ferè duplo augent.

Nam paralleli, quos lens convexa fecit convergere, sic convergendo incident-


incidentes in cavam, eâ transitâ vitantes concursum rursus divergunt versus oculum per CVII. supponitur enim Instrumentum & in eo situs cavæ lentis utilis. Iam vero alterâ cavâ inter oculum & priorem cavam interpositâ, quæ intercipiat divergentes, facit eos, ubi trajecterint, divergere amplius per XCIV. peccant igitur excessu divergentiæ, & confusa præstant per XCV & XCIX. Augeri igitur oportebit contrariam ex convexa convergentiam, ut vitia æquiponderent, seq̃ invicem tollant, per CIV. Augetur verò convergentia & ex illa confusio, si longius discedat lens convexa ab oculo intra punctum concursus constituto per LXXI. Ergo duæ lentæ cavæ cum oculo sibi proximè adhærenti, longius abesse debent à convexâ, quam unica earum. Vel per CXXVI. binæ lentæ cavæ circulo majore æquivalent, unica circulo minori. At per CX. Cava parvo circulo longius à lente distat, quàm unica magno circulo cava. Ergo & binæ magno circulo cavæ, plus distant quàm earum una sola.

Dico & majora representari visibilia per duas, quam per unam cavam proximè oculum. Demonstratur (ut priora) ex CXIII. & CXXVI.

Parvula verò auctio distantie magnam facit accessionem ad magnitudinem speciei per CXIV.

CXXIIX. PROPOSITIO.

In lente, quæ æqualibus circulis hinc convexa est, inde cava, omnes radij qui perpendiculari intra corpus paralleli incedunt, æqualibus angulis in utraq; superficie refringuntur & refracti retinent divergentiam aut parallelitatem eandem.



Sit lens circulo BC , cujus centrum A , convexa, circulo verò EF , cujus centrum D , concava. Incedat per centra recta DA , secans superficies perpendiculariter in F, C . Ducatur ei parallela quacungq, secans superficies perpendiculariter sitq, B, E . Demonstratur igitur Geometricè præsertim à Ptolomæo & Astronomis, sicut CF & BE , sic CB , & FE esse æquales. Proinde inclinatio BE ad utramq, superficiem est eadem, hoc est, ad Tangentis superficiem in BE punctis incidentia. Sunt enim hi Tangentis paralleli. Quare & refractione erit eadem, & refracti ex corpore denso in plagam utramq, erunt paralleli, ut BC , EH . Eadem igitur divergentia aut convergentia EH exeuntium, quæ GB ingredientium: quantisper quidem BE, CF intra corpus paralleli fuerint.

CXXIX. PROPOSITIO.

Radij unius puncti in lentem simul convexam & cavam eodem circulo incidentes, si punctum longinquum fuerit transitâ lente convergunt, si propinquius diametro circuli; divergunt amplius quàm ab origine.

Puncti enim longinqui radij sunt paralleli per *XXIII*. Paralleli verò in convexum densius incidentes per *XXXIV*, convergunt intra corpus densum.

Esto ut G sit longinquum punctum, & GB, GC paralleli, & BE, CF convergant. Erit igitur EF brevior, quàm BC . Rectior igitur incidentia ipsius BE in EF , quàm in BC . Minor igitur refractione in E , quàm in B . Quare minor angulus GBE , quàm BEH . Non igitur GB & EH parallela. At GB, GC ponuntur parallela. Ergo EH, FA refracti convergunt, tandemq, concurrent.

Contra sit G punctum radians propinquius diametro circuli. Erunt igitur GB, GC radij divergentes. Sic autem ingressi convexum densius, minus quidem divergent, sed tamen divergent, per *XXXVII*.

Cum

Cum igitur divergant BE, CF versus cavum corporis densi terminum E, F . major erit EF , quàm BC . Obliquior igitur incidentia BE in E , quàm in B , major igitur refractio illic quàm hic. Major igitur angulus GBE , minor BEH , non igitur parallelae $GB, \& EH$, sed quasi concurrentes inter se, si producerentur versus H . Plus igitur divergunt à se mutuò refracti EH, FA quàm primitivi GB, GC .


CXXX. PROPOSITIO.

Si cavitas ex majori circulo fuerit, quàm convexitas, radij puncti longinqui trajeclâ lente convergunt: plus quidem (seu post brevius intervallum, quàm si solum convexum esset) si cavitatis circulus major fuerit triplo circuli convexitatis; minus verò (& post majus intervallum) si minor triplo fuerit.

Seu


Cavitas majoris circuli derogans convexitati minoris, præstat effectum convexitatis circuli valdè magni. Dicatur Meniscus. Aequipollet lentipurè convexæ.

Sint CF, BE refracti in corpore, allapsi à puncto G longinquo. Convergent igitur versus EF per XXXIV. minor igitur erit EF , quàm BC . At simul $\&$ circulus ejus major. Igitur BE rectius in E incidet, quàm in B . Minor itaq; refractio in E , quàm in B . Major igitur angulus BEH quàm EBG . Non sunt igitur inter se paralleli $HE \& BG$, sed versus G producti concurrerent, $\&$ sic EH, FH inter se convergent, versus H .



Sit jam A centrum Circuli BC & CH tripla ad CA . Et sit infra H punctum R . Quod si BC sola fuerit, convergent BE & CF in H per XXXIV. Sit jam ipsius EF circuli centrum R . Et ducta ER perpendiculari, BE ab ER refringetur per II . & supra H cum CH concurret, sit in P . Ergo EP & FP magis convergunt, quàm BE , CF : & CP distantia concursus P , minor est, quàm CH .

Rursum ipsius EF circuli centrum sit supra H puta in P , & ducta perpendiculari EP , radius BE refringetur in E à perpendiculari longius quàm EH , per II concurretq; refractus cum FH infra H , concurrat in R . Minor igitur erit divergentia ipsorum ER , FR , quàm BE , CF . Et intervallo majori CR , quàm est CH , elongabitur concursus R . Quod si centrum EF est in H , sesquidiametro infra C , tunc concursus etiã fit in H , & sic EF nihil nec juvat, nec impedit ipsam BC .



CXXXI PROPOSITIO. PROBL.

Punctum concursus pro Menisco invenire. Seu, quantum attenuatur lens, tantum elongari concursum.

Sit $ABCD$ Meniscus, $E F$ centra. Quod si ABC sola convexitas faceret refractionem, concursus esset post tres BE semidiametros per XXXIV. At sola facit si circulus cavitatis ADC sit triplus ad convexitatis circulum ABC , hoc est, si BF tripla fuerit ad BE . Quia enim concursus est post tres semidiametros BE : esset igitur concur-

sus in

sus in F centro AD Circuli: quàm radij per corpus ABC transcuntes omnes perpendiculares inciderent in ADC ; non igitur refringerentur. Lentis igitur $ABCD$ concursus est post tres semidiametros.

Rursum cum lens est utrimq; æqualiter convexa, ut ABC , AHC concursus unâ semidiametro BE à B abest, in E , per XXXIX.

Tertiò cum lens est $AGCH$, plana in AGC , paralleli in AGC nihil refracti, concurrunt post duos semidiametros per XXXV. ut in S .

Quartò per CXXV. si duæ lentes jungerentur, concursus dimidio ipsius EB abesset.

Ex his igitur vestigijs apparet, ferè qua proportione lentis crassities BD minuitur, ea proportione augeri distantiam puncti concursus à lentis. Nam cum crassities esset bis BH , distantia dimidium fuit de BE . Cum illa semel BH , hac semel BE , cum illa dimidia sc. GH , hac bis erat BE scilicet BS . Iam cum ipsi GH vel BG tertia paulò minus pars decederet, accessit duabus BE , ES semidiametris tertia SF .

Esse autem DG minus tertiâ parte de GB , vel GH , sic probatur.

Sit enim AB vel 30° . vel $0^\circ 30'$. Per VII. ex abundantia, erit

AG vel 5000000 vel 87265

Et GB vel 1339746 vel 381

Qualium BE 10000000: talium vero est ferè

DF ----- 30000000. Vt autem DF , ad BE scilicet ut 3 ad 1. Sic AG ad sinum arcus AD . Est ergò

Sinus vel 1666667 vel 29088.

quorum arcus vel $9^\circ 36'$. vel $0^\circ 10'$.

complementa vel 80.24. vel 89.50.

Sinus versi vel 140039 vel 41.

Vt autem Sinus totus ad hos versos, sic DF 30000000 ad DG .

Est ergò DG vel 420117 vel 123.

Fuit autem BG 1339746 vel 381.

Vides ergò DG esse minus tertia parte, de BG .

Quintò igitur consentaneum est, si jam quarta pars ipsius DB dece-

K dat,

dat, quartam BE accessuram; ut ita rursus
 BG amissa tertia paulò minus, & residui quar-
 ta, id est totius dimidia, acquirat ad inter-
 vallum concursus pro duabus BE semidiame-
 tros quatuor, ut BT . Nam si abstuleris.

	420117	vel	123.
ab	1339746	vel	381.
restat	919629	vel	258.
hujus quartâ	229907	vel	64.
ablata, rest.	689722	vel	192.


dimidium ferè ipsius BG .

Itaq, quantum attenuatur lens, tantum e-
 longatur concursus ferè.

CXXXII. PROPOSITIO.

Si cavitas ex minori circulo fuerit
 quàm convexitas; radij unius puncti di-
 ametro post convexum collocati diver-
 gunt amplius transitâ lente. Seu Conve-
 xitas majoris circuli derogans cavitati
 minoris, præstat effectum cavitatis cir-
 culi valde magni.

Radij enim CE, DF intra corpus à pun-
 cto G venientes, si id diametro distat à con-
 vexo, paralleli sunt per XXXV. Quare secant
 EF concavam, obliquius quàm convexam
 CD . Cetera ut CXXIX. sin G propius fuerit:
 CE & DF intra corpus divergent versus EF
 per XXXVII. magis autem EH, FB refracti in
 aëre per XCII.



Propo-

CXXXIII. PROPOSITIO.

Si cavitas lentis unâ superficie convexæ, centrum suum habuerit interius centro convexi: radij puncti etiam longinqui per lentem efficiuntur divergentes. Illa æquipollet lenti purè cavæ circulo valde magno.

Nam sit G punctum longinquum, ergo ejus radij GC , GD paralleli sunt per *XXIII*. Ergo CE , DF intra corpus convergent per *XXXIV*. ac si concursura essent sesquidiametro convexitatis in HH . Quòd si centro B , circulus minor, per E scriberetur, tum EB , FB interciperent portionem ejus majorem, quàm est CD respectu sui circuli. Patet; cum enim CE tendat versus HH ; punctum E inferius est lineâ CB , CB verò (& non CHH) abscinderet demum portiones similes. Multò magis igitur tunc E , F major erit circuli sui portio, cum ejus centrum est supra B , ut in A . Quia ergo major est portio EF , quàm CD , major est etiam inclinatio CE ad EF , quàm ad CD . Major igitur refraçtio in E extrosum, per *II*, quàm in C introrsum versus BDG . Non sunt igitur parallele GC , EH . Et cum GC , GD ponantur parallele; DB , EH earum refractæ in E F cavo termino densi corporis divergent.

CXXXIV.

Diversi generis lentes puræ, associatæ, invicemq; contiguous, æquipollent lenti mixti generis, & tandem lenti puræ.

Demonstratur ferè ut *CXXV*. Sit enim lens convexa OP , & cava QR , & redigatur ipsius OP utraq; convexa superficies in unam convexam ST per *LXXIX*.

Per *CXXVI*, verò etiam ipsius QR cavitates redigantur in unam VX sitq; mixti generis lens $STXV$, quod si præpoller cavitatis VX , hoc est, si ejus circulus est minor lens mixta æquipollet purè cavæ per *CXXXIII*. Ac proinde OP , QR diversi generis junctæ æquipollent purè

cavæ circuli valdè magni. Sin autem præpol-
 leret convexitas ST , propter minorem circu-
 lum, ut in schemate prop. CXXXI. in menisco,
 ABC convexitas major, ADC cavitas mi-
 nor, tunc lens mixta SX , ac proinde etiam due
 invicem sociatæ OP , QR junctæ equipollent
 purè convexæ per CXXX.



CXXXV. PROBLEMA.

Instrumentum parare magni circu-
 li convexo, quod brevius sit opinione
 illorum, qui communia fabricant.



*Fit geminato convexo unico, altero intus latente, quod speculator
 ignoret. Per CXXXV.*

CXXXVI. PROBLEMA.

Instrumentum parare magni circuli cavo (& qui etiam
 superet circulum convexi) quod visibilia repræsentet majora
 opinione eorum, qui communia instrumenta fabricant.

Fit geminato cavo pro uno, quod speculator ignoret. Per CXXXVII.

CXXXVII. PROBLEMA.

Convexo parvi circuli, & minoris etiam, quàm est circulus
 concavi apud oculum (quod absurdum videtur, per CVII.)
 longissimum efficere instrumentum, & ingentia præstare visi-
 bilia.


*Vel enim compone certa cum attemperazione convexum minoris
 circuli cum cavo majoris intus latente & inconspicuo, & sequetur effe-
 ctus per CXXXIV. Vel lente utere mixta, convexâ foris minori circulo,
 concava intus majori, per CXXX. Et locum cavae lenti alteri, quæ ad o-
 culû est applicanda, quare per CXXXI. Tenta etiã aliquid per CXXXIIX.*

Propo-

CXXXIIX. PROPOSITIO.

Manente eadem distantia lentis ab oculo & linea ex oculo in lentis umbilicum per centra convexitatum vel cavitatum transeunte, refractiones contingunt proximè eadem, utram velis dissimilium superficierum lentis, oculo obvertas.

Videtur absurda & contra prop. xxxiv. & xxxv. Nam in schemate p. xxxiv. convexa superficies densi, BCD obversa parallelis cogit illos in F intervallo sesquidiametri. At in xxxv. superficies densa PQR averfa à parallelis cogit eos in S intervallo diametri. Sed meminisse debes ibi sermonem esse de unica superficie, cum qualibet lens habeat necessario duas. Item per xxxiv. paralleli considerantur in aere, prop. xxxv. considerantur intra corpus densum, itaq; comparari non possunt. Quod si terminetur utraq; illarum lentium etiam altera superficie sic ut maneant F. S. puncta concursuum, apparebit diversitas. Centro enim F, intervallo FB, scribatur pro altera superficie circuli portio B K D secans IAF in K, BCD in BD punctis; ut ita radij concurrentes in F sint omnes ipsi B K D perpendiculara-



K 3 res, ac

res ac proinde nihil refringantur in BKD . In altero verò schemate p. XXXV. sit arcus PQR equalis & similis arcui BCD , & Q punctum medium, terminiq; PR connectantur rectâ secante perpendicularem OS in V , qua significet alteram planam lentis superficiem, in quam omnes ipsi OP paralleli sint perpendiculares. Igitur in PVR nihil refringentur manebitq; concursus in S . Iam igitur patet, lentes, quarum altera sesquidiametro CF , altera diametro QS concurrere facit parallelos, esse diversa crassitiei, cum sint convexitate similes & aequales. Illa habet crassitiam minorem CK , hac majorem QV . Differentia utriusq; est sinus versus arcus BK . Quare nihil mirum, quod in illa intervallum concursus, habet tres semidiametros, in hac duas tantum, - per CXXXI. Elucescet autem veritas propositionis etiam sic. Avertantur in schemate prop. XXXIV. Circuli BCD , BKD à parallelis, manentibus punctis BD : Ut ita paralleli primum incidant in cavum densum BKD : ij divergent per corpus versus BCD convexum densi per XC : at si per corpus paralleli mansissent, ut in schem. prop. XXXV. concurrissent post convexum duabus semidiametris per prop. XXXV. Sed quia divergunt versus BCD (ut si convergerent in altero schemate versus PQR .) æquum igitur est ut post S . concurrant longius per XI , scilicet in F . Idem etiam in schem. Prop. XXXV. facile est probare. Si enim PQR obvertantur parallelis ij intra corpus convergent, ac si vellent post tres semidiametros concurrere ut in BCD versus F . Convergenndo igitur igitur transeuntes corpus, & incidentes in terminum ejus planum, ad eum inclinantur, quare jam in plano & refringuntur, qualibet à sui puncti perpendiculari. Cumq; respectu totius lentis abnuant & à se mutuò intra corpus, & à suis perpendiculis, refracti igitur in aëre foris tantò magis inter se coeunt, fugientes à perpendiculis suis singuli. Et sic non mirum quòd citius coeunt, quam

quàm post tres semidiametros, scilicet in S. Et hæc demonstratio evincit in genere propositum. Interim parvula est diversitas, cujus causa non datur accurata demonstratio. Potest autem qui vult uti numeris ad explorandam insensibilitatem, uti supra p. XXXIV. & ipse feci.

CXXXIX. PROBLEMA.

Vt vitrum utrumque sit cavum, & quod ad oculum, & quod ad visibile vergit, & tamen effectus sequatur.

*Aut pone foris versus visibile pro convexo solitario in conspectu cavum locum cui intus adhaereat occultè convexum tanto angustioris circuli, ut prop. CXXXVII. Aut ibi mixto utere, ut prop. CXXXVII, cujus cavum foras vertatur. Nam per CXXXIIX. peris-
de est, ut cunq; vertas.*

CXL.

Tubum præparare, cuius vitrum utrumque sit convexum, & quod ad oculum, & quod ad visibile vergit, ut nihilominus effectus sequatur.

Apud oculum pro uno cavo compone convexum cum cavo minoris circuli, & fac convexum magni circuli foris apud oculum spectari, cavum intus latere per CXXXIV. Vel apud oculum utere mixto, cujus convexitas magno circulo foras promineat, cavitas parvo & tanto minori circulo intrò. per CXXXIII.


Propo-

CXLI. PROBLEMA.

Tubum præparare, cuius vitrum ad oculum sit convexum, ad visibilia cavum.

Est compositio ex CXXXIX. & CXL. Qua enim ibi fiebant seorsim, in altero vitro, hic fieri debent junctim in utroq.

F I N I S.




ERRATA IN DIOPTRICE, PROPTER
 difficultatem materiæ in absentia authoris com-
 missa: sic corrigantur.

Fol. 1. lin. 22. obtrusisse. F. 2. l. 9. absistit. Fol. 4. l. 16. allegamus. Fol. 5. l. 1. set eum Tell. F. 8. l. 21. ut dem. F. 11. l. 8. plura etiam ab. F. 15. l. 7. 8. certò. F. 16. l. 4. 28. circuli se mutuo tangant in recta linea. l. 11. non circularis sed oblonga & ovalis sit figura. l. 14. Hor ecco. Fol. 17. l. 4. corrigatur figura, ut prius. P. 19. l. 17. le lettere. F. 24. l. 22. accade. l. 30. e dico. F. 27. l. 15. scientifica. l. 22. Nationum. l. 25. cujusdam Simonis Marij Franci astronomi celebris. Leniora lector linguarum peritus facile emendabit.

Pag. 2. lin. 2. Extante in. lin. 10. inter M. B & . Pag. 3. lin. 13. conspicua. P. 4. l. 24. atura vertice, pot: l. 26. plana. P. 6. l. 22. angulo ADI, P. 8. l. 10. in G infra, put: P. 9. l. qua vel. P. 13. l. 15. et si verum est. lin. 20. perpendiculariter. P. 14. in schemate BEF debent esse in una recta. P. 15. l. penult. Semidiametri majoris mensura in. P. 16. l. 12. propinquet. l. 14. concursus. P. 17. Nota qua sequuntur post XLV. pertinent ad demonstrationem ipsius XLIV. P. 19. l. 18. Sin altrobique plana. P. 20. l. 2 retraxeris lumen à. P. 22. in schemate linea punctata ex angulis RAO & QGO exeat. l. 18. Si BCD in C rursus. P. 24. l. 23. nervum opticum retiformem est. P. 30. in schemate protrahatur GI in AD, & in sectione scribatur litera Q. P. 32. in schemate BO & KP concurrant in F. P. 34. l. 5. pupilla. l. 16. lucentis. P. 35. l. 20. 21. dele voces, ab uno visibilis puncti concursus radiorum. P. 36. in schemate CAF, & CBG debent esse in una recta, & AM, BN debent extrorsum esse flexa. l. 5. connexis. l. 24. quàm est; per LXVIII. Nam per XIX. P. 40. l. 15. Nam per XXCII. P. 42. l. 19. puncto DO, DP, ejusq. angulus. P. 46. l. 11. II, sit BL. Simil. l. 13. sed DBE, P. 47. l. 7. perpendiculares. l. 10. rarioris. l. 26. puncti radiantis.

antis. P. 49. in schemate pro C Q, scribe C E l. 19. B D int. P. 52. l. 13 Divergen. P. 52. l. 22 usq. tubus. P. 56. l. ult. sederet &. P. 61. l. 2. convexa. l. 16. circuli cum oculo. P. 64. l. 19. CAI, CHG. P. 66. l. 13. ento tegitur. P. 70. l. 7. 8. Tangentes. l. 24. Quare major. P. 71. l. 3. 4. Minor igitur angulus G B E, major B E H. l. 24. in B. Minor igi: l. 26. dele vocem, versus G. P. 73. l. 1. quia radij l. 11. 12. a lente. P. 79. l. 10. dele vocem locum.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

In Tabula anatomica 49, Cl: viri Felicis Plateri, quæ inserta est fol. 177 meorum ad Vitellionem Paralipomenon, seu Astronomiæ partis Opticæ, apparet numero X figura Tela aranea, in cujus medio suspenditur crystallinus humor, cujus genuina figura est numero XIII situs in oculo numero I, apud literam a: ubi radij tela araneæ representantur per K K. Fines vero radiorum, qui numero X ambiuntur circulo, cogitentur esse continuati cum tunica uvea intus. Itaq; numero VII. vides illam tunicam eversam & apud literas o. o. vestigia radiorum illorum à tunica uvea rescissorum. Ibidem litera n, est index pupillæ. Cum ergo & hæc tunica, & dicti radij tela araneæ sint ex substantiâ eadem & continua invicem corpora, colore etiã eodem nigro: valde probabile est & naturam motus utrisq; eandem esse. Est autem naturalis conniventia partium circa n, aut contraria ampliatio. Quare & hoc naturale esse videtur, radios numero X, interdum in se recurrentes abbreviari, & sic circulum quo ambiuntur, ejusq; vestigia numero VII, apud o. o. coangustari simulq; crystallinum in o. o. à fundo p. elongari. E contrario exprorectio in longum radijs numero X, quod fit attenuatione singulorum, ampliatur circulus extrema illorum includens, & representans numero VII vestigia rescissorum radiorum supra o. o. Quæ ratione fit, ut ampliato circulo o. o. fundus p. propius attrahatur ad crystallinum in medio circuli o. o. suspensum.

Reliquarum partium oculi explicatio utilis propp. 60. 61. 62. 63. 64. petatur ex Platero & mea Ast: parte Optica.

2500-

S.D.

Casper 40

1680-

collated
complete
8/21/65

~~1680-~~
C

